

BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Pyralvex zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
- Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na 7 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. *Wat is Pyralvex en waarvoor wordt het gebruikt?*
2. *Wat u moet weten voordat u Pyralvex gebruikt?*
3. *Hoe wordt Pyralvex gebruikt?*
4. *Mogelijke bijwerkingen*
5. *Hoe bewaart u Pyralvex?*
6. *Aanvullende informatie*

Naam

Pyralvex

Samenstelling

De werkzame bestanddelen zijn:

- Anthrachinon extract van rabarber (ongeveer 50 mg) overeenkomend met 4,8 mg anthrachinonderivaten per ml oplossing.
- Salicylzuur 10 mg per ml oplossing.

De overige bestanddelen zijn:

- Ethanol 96%
- Gezuiverd water

Registratiehouder

Meda Pharma n.v.
Terhulpssteenweg, 166
B- 1170 Brussel

Fabricant

Norgine Pharma
Rue Ethe Virton, 129
BP 44
28100 Dreux
France

Registratienummer

BE 187485

1. Wat is Pyralvex en waarvoor wordt het gebruikt ?

Pyralvex is een applicatievloeistof voor gebruik in de mond.
Het bestaat uit een fles met 10 ml vloeistof.

Pyralvex werkt ontstekingswerend en antibacterieel.

Pyralvex wordt gebruikt voor aanvullende plaatselijke behandeling van ontstekingen van het mondslijmvlies:

- aften
- ander letsel van de mondholte

2. Wat u moet weten voordat u Pyralvex gebruikt

Gebruik Pyralvex niet

- Als u overgevoelig bent voor anthrachinon extract van rabarber of salicylzuur of voor één van de andere bestanddelen van Pyralvex

Pas goed op met Pyralvex

- Als u een algemene bacteriële infectie heeft. In dat geval dient een behandeling met antibiotica overwogen te worden.
- Als de klachten aanhouden of regelmatig terugkeren. In dat geval dient men de behandelend (tand)arts te raadplegen.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van Pyralvex in combinatie met andere geneesmiddelen.” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Pyralvex mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Pyralvex mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Pyralvex heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Pyralvex

Pyralvex bevat 59 % v/v ethanol.

Gebruik van Pyralvex in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen of voedingsmiddelen bekend.

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

3. Hoe wordt Pyralvex gebruikt ?

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. Ga naar uw arts indien de verschijnselen verergeren of na enkele dagen niet verbeteren.

Dosering

Volwassenen en ouderen:
De gebruikte dosis is 2 tot 4 toepassingen per dag.
Niet gebruiken bij kinderen onder de 6 jaar.

Wijze van gebruik

Pyralvex wordt aangebracht door aanstippen van het ontstoken tandvlees met een penseel, met een wattenstaafje of door verstuiving. Onmiddellijk na de behandeling mag de mond niet met water of andere vloeistoffen (zoals bijv. mondspoelmiddelen) gespoeld worden. Dit vanwege het feit dat de bestanddelen van Pyralvex dan weggespoeld kunnen worden.

Wat u moet doen wanneer u Pyralvex vergeet te gebruiken

Niet van toepassing

Wat u moet doen als u meer van Pyralvex heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Pyralvex heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245)

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Pyralvex bijwerkingen hebben.

Een gele verkleuring van de tanden, die snel verdwijnt, kan voorkomen.

Ter hoogte van de toedieningsplaats kan een tijdelijke pijngewaarwording of branderig gevoel optreden.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Pyralvex

Pyralvex buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Het flesje na gebruik goed sluiten.

Gebruik Pyralvex niet meer na de datum achter “EXP” op het etiket.

6. Aanvullende informatie

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker

Afleveringswijze

Vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in:

Januari 2011.

De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is:

02/2011