

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

**Imitrex Instant 50 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen**  
**Imitrex Instant 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen**

### Sumatriptan

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. **WAS IST IMITREX INSTANT UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**
2. **WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON IMITREX INSTANT BEACHTEN?**
3. **WIE IST IMITREX INSTANT EINZUNEHMEN?**
4. **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**
5. **WIE IST IMITREX INSTANT AUFZUBEWAHREN?**
6. **INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

### 1. WAS IST IMITREX INSTANT UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Jede Imitrex Instant Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen enthält Sumatriptan. Dieses Arzneimittel gehört zur Familie der Triptane (auch 5-HT<sub>1</sub>-Rezeptor-Agonisten genannt).

**Imitrex Instant wird zur Behandlung von Migränekopfschmerz angewendet.**

Migränesymptome können durch die vorübergehende Erweiterung der Blutgefäße im Kopf verursacht werden. Man nimmt an, dass Imitrex Instant diese Erweiterung der Blutgefäße vermindert. Das trägt dazu bei, dass die Kopfschmerzen vergehen und andere Symptome des Migräneanfalls gelindert werden, wie z. B. Übelkeit oder Erbrechen sowie Licht- und Lärmempfindlichkeit.

### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON IMITREX INSTANT BEACHTEN?

**Imitrex Instant darf nicht eingenommen werden,**

- **wenn Sie allergisch** gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- **wenn Sie eine Herzerkrankung haben**, wie z. B. Verengung der Herzkranzgefäße (*ischämische Herzkrankheit*) oder Brustschmerzen (*Angina pectoris*), oder wenn Sie bereits einen Herzinfarkt hatten.
- **wenn Sie Durchblutungsstörungen in Ihren Beinen haben**, die krampfartige Schmerzen beim Gehen verursachen (*periphere Gefäßerkrankung*).
- **wenn Sie einen Schlaganfall** oder eine transitorische Ischämische Attacke (TIA) hatten.
- **wenn Sie an Bluthochdruck leiden**. Sie können Imitrex Instant einnehmen, wenn Ihr Blutdruck leicht erhöht und gut eingestellt ist.
- **wenn Sie eine schwere Leberinsuffizienz haben**.
- **wenn Sie andere Migräne-Arzneimittel einnehmen**, einschließlich solcher, die Ergotamin enthalten, oder vergleichbare Arzneimittel (wie Methysergid) oder einen anderen Triptan/5-HT<sub>1</sub>-Rezeptor-Agonisten (Arzneimittel, die ebenfalls zur Behandlung von Migräne angewendet werden).
- **wenn Sie bestimmte Antidepressiva, sogenannte Monoaminoxidase-Hemmer (MAO-Hemmer)** anwenden, oder innerhalb der letzten zwei Wochen angewendet haben.

Wenn eine dieser Gegenanzeigen auf Sie zutrifft:

⇒ **Informieren Sie Ihren Arzt und nehmen Sie Imitrex Instant nicht ein.**

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Imitrex Instant einnehmen.

#### Wenn Sie bestimmte Risikofaktoren haben:

- **Wenn Sie ein starker Raucher sind** oder wenn Sie sich einer **Nikotinersatztherapie**, unterziehen, insbesondere
- **wenn Sie ein Mann über 40 Jahren sind** oder
- **wenn Sie eine Frau nach den Wechseljahren (Menopause) sind.**

In sehr seltenen Fällen sind bei Patienten nach der Einnahme von Imitrex Instant schwerwiegende Herzprobleme aufgetreten, ohne dass es vorher Anzeichen für eine Herzerkrankung gab. Wenn einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft, könnte das bedeuten, dass Sie ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Herzerkrankung haben.

⇒ **Informieren Sie Ihren Arzt, damit Ihre Herzfunktion überprüft werden kann**, bevor Ihnen Imitrex Instant verschrieben wird.

#### Wenn Sie in der Vergangenheit an Konvulsionen (*epileptischen Anfällen*) gelitten haben

oder bei Ihnen Risikofaktoren vorliegen, die die Gefahr von Konvulsionen erhöhen, zum Beispiel eine Kopfverletzung oder Alkoholabhängigkeit:

⇒ **Informieren Sie Ihren Arzt, damit er Sie genauer überwachen kann.**

#### Wenn Sie eine Leber- oder Nierenerkrankung haben:

⇒ **Informieren Sie Ihren Arzt, damit er Sie genauer überwachen kann.**

#### Wenn Sie allergisch gegen sogenannte Sulfonamid-Antibiotika sind

Wenn dies der Fall ist, könnten Sie ebenfalls allergisch gegen Imitrex Instant sein. Falls Sie wissen, dass Sie allergisch gegen ein Antibiotikum sind, aber nicht wissen, ob es sich um ein Sulfonamid handelt:

⇒ **Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Imitrex Instant einnehmen.**

#### Wenn Sie Arzneimittel gegen Depressionen, sogenannte SSRI (*selektive Serotonin-Reuptake-Hemmer*) oder SNRI (*Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Hemmer*) einnehmen.

⇒ **Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Imitrex Instant einnehmen.** Siehe auch *Einnahme von Imitrex Instant zusammen mit anderen Arzneimitteln* weiter unten.

#### Wenn Sie Imitrex Instant häufig einnehmen

Eine zu häufige Einnahme von Imitrex Instant kann Ihre Kopfschmerzen verschlimmern.

⇒ **Informieren Sie Ihren Arzt, wenn dies auf Sie zutrifft.** Er wird Ihnen möglicherweise das Absetzen von Imitrex Instant empfehlen.

#### Wenn Sie nach der Einnahme von Imitrex Instant Schmerzen oder Engegefühl im Brustkorb fühlen

Diese Wirkungen können intensiv sein, gehen aber üblicherweise schnell vorüber. Falls sie nicht schnell vorübergehen oder falls sie schlimmer werden:

⇒ **Suchen Sie umgehend einen Arzt auf.** In Abschnitt 4 dieser Packungsbeilage finden Sie weitere Informationen zu diesen möglichen Nebenwirkungen.

#### Einnahme von Imitrex Instant zusammen mit anderen Arzneimitteln

**Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen**, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen, auch wenn es sich dabei um pflanzliche Produkte oder nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Manche Arzneimittel dürfen nicht zusammen mit Imitrex Instant eingenommen werden. Andere Arzneimittel können Nebenwirkungen verursachen, wenn sie zusammen mit Imitrex Instant eingenommen werden. **Sie müssen Ihren Arzt informieren, wenn Sie folgende Arzneimittel einnehmen:**

- **Ergotamin**, das ebenfalls zur **Migränebehandlung** eingesetzt wird, oder ähnliche Arzneimittel, wie z. B. Methysergid (siehe Abschnitt 2 unter "Imitrex Instant darf nicht eingenommen werden"). Nehmen Sie Imitrex Instant nicht gleichzeitig mit diesen Arzneimitteln ein. Beenden Sie die Einnahme dieser Arzneimittel mindestens 24 Stunden vor der Einnahme von Imitrex Instant. Nehmen Sie nach der Einnahme von Imitrex Instant mindestens 6 Stunden lang keine Arzneimittel ein, die Ergotamin oder mit Ergotamin verwandte Substanzen enthalten.
- **Andere Triptane/5-HT<sub>1</sub>-Rezeptor-Agonisten** (wie z. B. Naratriptan, Rizatriptan, Zolmitriptan), die auch zur Behandlung von **Migräne** angewendet werden (siehe Abschnitt 2 unter "Imitrex Instant darf nicht eingenommen werden"). Nehmen Sie Imitrex Instant nicht gleichzeitig mit diesen Arzneimitteln ein. Beenden Sie die Einnahme dieser Arzneimittel mindestens 24 Stunden vor der Einnahme von Imitrex Instant. Nehmen Sie nach der Einnahme von Imitrex Instant mindestens 24 Stunden lang keinen anderen Triptan/5-HT<sub>1</sub>-Rezeptor-Agonisten ein.

- **SSRI** (*selektive Serotonin-Reuptake-Hemmer*) oder **SNRI** (*Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Hemmer*) zur Behandlung von **Depressionen**. Die gleichzeitige Einnahme von Imitrex Instant mit diesen Arzneimitteln kann ein sogenanntes Serotonin-Syndrom verursachen (Symptome können Unruhe, Verwirrtheit, Schwitzen, Halluzinationen, gesteigerte Reflexe, Muskelkrämpfe, Schüttelfrost, erhöhten Herzschlag und Zittern einschließen). Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn diese Symptome bei Ihnen auftreten.
- **MAOH** (*Monoaminoxidase-Hemmer*) zur Behandlung von **Depressionen**. Nehmen Sie Imitrex Instant nicht ein, wenn Sie ein derartiges Arzneimittel innerhalb der letzten zwei Wochen eingenommen haben.
- **Johanniskraut** (*Hypericum perforatum*). Das Risiko für Nebenwirkungen kann sich bei gleichzeitiger Einnahme von Imitrex Instant und pflanzlichen Präparaten, die Johanniskraut enthalten, erhöhen.

#### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

##### Schwangerschaft

Es liegen bisher nur begrenzte Informationen zur Sicherheit von Imitrex Instant bei schwangeren Frauen vor. Es gibt bislang allerdings keinen Anhalt für ein erhöhtes Risiko von Geburtsfehlern. Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen, ob Sie Imitrex Instant während der Schwangerschaft anwenden sollten oder nicht.

##### Stillzeit

**Stillen Sie Ihr Baby 12 Stunden lang nicht, nachdem Sie Imitrex Instant eingenommen haben.** Wenn Sie Muttermilch während dieser Zeit ausscheiden, entsorgen Sie die Milch und geben Sie sie Ihrem Baby nicht.

Einige stillende Frauen berichten nach der Anwendung von Sumatriptan über Brustschmerz und/oder Brustwarzenschmerz. Der Schmerz ist in der Regel vorübergehend und verschwindet innerhalb von 3 bis 12 Stunden.

##### Fortpflanzungsfähigkeit

Es liegen keine Daten zur Wirkung von Imitrex Instant auf die Fortpflanzungsfähigkeit bei Männern und Frauen vor.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Sowohl die Symptome eines Migräneanfalls als auch die Einnahme Ihres Arzneimittels können Müdigkeit hervorrufen. **Wenn Sie hiervon betroffen sind, fahren Sie kein Fahrzeug und bedienen Sie keine Maschinen.**

#### **Imitrex Instant enthält Natrium**

- Imitrex Instant 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen enthält 12,5 mg Natrium (Hauptbestandteil von Kochsalz, Speisesalz) pro Tablette (25 mg/2 Tabletten). Für 2 Tabletten, dies entspricht 1,25% der für einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Natriumaufnahme mit der Nahrung.
- Imitrex Instant 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, d.h. es ist nahezu "natriumfrei".

### 3. WIE IST IMITREX INSTANT EINZUNEHMEN?

**Nehmen Sie Imitrex Instant erst dann ein, wenn der Migränekopfschmerz begonnen hat. Nehmen Sie Imitrex Instant nicht ein, um einer Migräneattacke vorzubeugen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

**Wie und in welcher Menge ist Imitrex Instant einzunehmen?**

**Erwachsene (von 18 bis 65 Jahren)**

- Die übliche Dosis für Erwachsene von 18 bis 65 Jahren beträgt eine Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen von 50 mg, bei manchen Personen sind möglicherweise jedoch Dosierungen von 100 mg erforderlich.
- Nehmen Sie nicht mehr als 6 Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen von 50 mg oder 3 Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen von 100 mg innerhalb von 24 Stunden ein, das heißt insgesamt 300 mg.

**Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

Imitrex Instant wird nicht bei Kindern unter 18 Jahren empfohlen.

**Ältere Patienten (über 65 Jahren)**

Imitrex Instant wird nicht bei Patienten über 65 Jahren empfohlen.

**Wann sollten Sie Imitrex Instant einnehmen?**

**Am besten nehmen Sie Imitrex Instant ein, sobald Sie bemerken, dass der Migränekopfschmerz beginnt.** Die Einnahme kann aber auch zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt während einer Migräneattacke erfolgen.

**Wenn Ihre Symptome wiederkehren ...**

Sie können 2 Stunden nach der Einnahme der ersten Imitrex Instant Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen eine zweite Tablette einnehmen. Sie dürfen jedoch nicht mehr als 6 Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen von 50 mg oder 3 Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen von 100 mg innerhalb von 24 Stunden einnehmen, das heißt insgesamt 300 mg.

**Wenn die erste Tablette keine Wirkung zeigt**

**Nehmen Sie keine zweite Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen oder eine andere Darreichungsform von Imitrex für dieselbe Migräneattacke ein.**

Wenn Ihnen Imitrex Instant keinerlei Linderung verschafft:

⇒ **Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.**

**Wenn Sie eine größere Menge von Imitrex Instant eingenommen haben, als Sie sollten**

Nehmen Sie nicht mehr als 6 Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen von 50 mg oder 3 Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen von 100 mg innerhalb von 24 Stunden ein, das heißt insgesamt 300 mg.

Die Einnahme von zu viel Imitrex Instant kann Sie krank machen. Wenn Sie mehr als 300 mg innerhalb von 24 Stunden eingenommen haben:

⇒ **Setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder dem Antigiftzentrum (070/245.245) in Verbindung.**

**Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.**

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Einige Symptome können durch die Migräne selbst hervorgerufen werden.

**Allergische Reaktionen: suchen Sie umgehend einen Arzt auf.**

Folgende Nebenwirkungen sind aufgetreten, ihre genaue Häufigkeit ist jedoch nicht bekannt.

- **Mögliche Anzeichen einer Allergie: Hautausschlag, Quaddeln (juckender Ausschlag), Atemschwierigkeiten, Anschwellen von Augenlidern, Gesicht oder Lippen, Kreislaufkollaps.**

Wenn Sie eines dieser Symptome unmittelbar nach der Einnahme von Imitrex Instant bemerken:

⇒ **Nehmen Sie kein Imitrex Instant mehr ein. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf.**

**Häufige Nebenwirkungen**

(können bis zu 1 von 10 Personen betreffen)

- Engegefühl oder Schmerzen im Brustkorb, im Rachen oder in anderen Körperteilen. Ungewöhnliche Empfindungen, einschließlich Taubheitsgefühl, Prickeln, Wärme- oder Kältegefühl. Diese Symptome können intensiv sein, gehen aber im Allgemeinen schnell vorüber. **Wenn diese Symptome andauern oder schlimmer werden** (insbesondere die Brustkorbschmerzen):

⇒ **Suchen Sie umgehend einen Arzt auf.** Bei sehr wenigen Patienten können diese Symptome durch einen Herzinfarkt verursacht sein.

### Weitere häufige Nebenwirkungen umfassen:

- Übelkeit oder Erbrechen, diese Symptome können jedoch auch durch die Migräneattacke ausgelöst werden.
- Müdigkeit, Schwäche.
- Schwindel, Schläfrigkeit.
- Vorübergehender Blutdruckanstieg, Hitzewallungen.
- Kurzatmigkeit.
- Muskelschmerzen.

### Seltene Nebenwirkungen

(können bis zu **1 von 1.000** Personen betreffen)

- Brustschmerz.

### Sehr seltene Nebenwirkungen

(können bis zu **1 von 10.000** Personen betreffen)

- Leberfunktionsstörungen. Wenn bei Ihnen die Leberwerte im Blut überprüft werden, informieren Sie Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal, dass Sie Imitrex Instant einnehmen.
- Unzureichende Blutzufuhr zu Armen und Beinen (*periphere vaskuläre Ischämie*)

### Bei manchen Patienten können folgende Nebenwirkungen auftreten, es ist jedoch nicht bekannt, wie häufig diese auftreten:

- Konvulsionen/epileptische Anfälle, Zittern, Muskelkrämpfe.
- Sehstörungen, wie Augenflimmern, Verminderung der Sehschärfe, Doppelsehen, Sehverlust und in einigen Fällen auch bleibender Sehverlust (die Sehstörungen können jedoch auch durch die Migräneattacke ausgelöst werden).
- Herzbeschwerden, bei denen sich der Herzschlag beschleunigen, verlangsamen oder den Rhythmus ändern kann, Schmerzen in der Brust (*Angina pectoris*) oder Herzinfarkt.
- Blässe, bläuliche Haut und/oder Schmerzen in den Fingern, Zehen, Ohren, in der Nase oder im Kiefer als Reaktion auf Kälte oder Stress (*Raynaud-Syndrom*).
- Schwächegefühl (Risiko eines Blutdruckabfalls).
- Schmerzen im Unterbauch, auf der linken Seite und blutiger Durchfall (*ischämische Kolitis*), Durchfall.
- Wenn Sie vor kurzem eine Verletzung hatten oder wenn Sie eine Entzündung haben (wie Rheuma oder eine Entzündung des Dickdarms), kann es sein, dass Sie an der Stelle der Verletzung oder der Entzündung Schmerzen verspüren oder dass sich die Schmerzen verschlimmern.
- Nackensteife, Gelenkschmerzen.
- Gefühl von Angst.
- Schluckbeschwerden.
- Übermäßiges Schwitzen.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

#### Belgien

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Abteilung Vigilanz

Website: [www.notifierunefetindesirable.be](http://www.notifierunefetindesirable.be)

E-Mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

#### Luxemburg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung

Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website: [www.guichet.lu/pharmakovigilanz](http://www.guichet.lu/pharmakovigilanz)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. WIE IST IMITREX INSTANT AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

### Was Imitrex Instant enthält

- **Der Wirkstoff** ist Sumatriptan. Die Tabletten enthalten 50 mg oder 100 mg Sumatriptan (als Succinat).
- **Die sonstigen Bestandteile** sind:

#### *Imitrex Instant 50 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen:*

Kern: Calciumhydrogenphosphat, mikrokristalline Cellulose, Natriumbicarbonat, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat.  
Beschichtung: Hypromellose, Titandioxid (E 171), Glyceroltriacetat, Eisenoxid rot (E 172).

#### *Imitrex Instant 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen:*

Kern: Calciumhydrogenphosphat, mikrokristalline Cellulose, Natriumbicarbonat, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat.  
Beschichtung: Hypromellose, Titandioxid (E 171), Glyceroltriacetat.

### Wie Imitrex Instant aussieht und Inhalt der Packung

Imitrex Instant 50 mg liegen als rosafarbene, bikonvexe und dreieckige Filmtabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen vor, auf die auf einer Seite GS 1YM und auf der anderen Seite 50 aufgedruckt ist. Packungen mit 2, 4, 6 und 12 Tabletten in kindergesicherten Blisterpackungen.

Imitrex Instant 100 mg liegen als weiße, bikonvexe, dreieckige Filmtabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen vor, auf die auf einer Seite GS YE7 und auf der anderen Seite 100 aufgedruckt ist. Packungen mit 2, und 6 Tabletten in kindergesicherten Blisterpackungen.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

#### Pharmazeutischer Unternehmer

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  
Avenue Fleming, 20  
B-1300 Wavre

#### Hersteller

Delpharm Poznań Spółka Akcyjna  
Ul. Grundwaldzka 189  
60-322 Poznan  
Polen

### Art der Abgabe

Verschreibungspflichtig.

### Zulassungsnummern

- Imitrex Instant 50 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen: BE279465; LU: 2006030004
- Imitrex Instant 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen: BE279474; LU: 2006030005

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 08/2025 (V22).**

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.

### Belgien/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  
Tel: + 32 (0)10 85 52 00