
Gebrauchsinformation: Information für Anwender
NORIT 250 mg Tabletten
NORIT 200 mg Hartkapseln
Aktivkohle

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. [WAS IST NORIT UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?](#)
2. [WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON NORIT BEACHTEN?](#)
3. [WIE IST NORIT EINZUNEHMEN?](#)
4. [WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?](#)
5. [WIE IST NORIT AUFZUBEWAHREN?](#)
6. [INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN](#)

1. WAS IST NORIT UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Norit enthält Aktivkohle. Diese wird Schadstoffen im Magen-Darmkanal binden und auf dieser Weise abführen.

Norit wird gebraucht als Hilfsmittel bei der Behandlung von Vergiftungen und bei Durchfallsymptome. Manchmal wird Norit in Form einer Magenspülung verabreicht. Dies erfolgt meistens im Krankenhaus.

Norit besteht in Form von Tabletten und Hartkapseln.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON NORIT BEACHTEN?

Norit darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie **überempfindlich** (allergisch) gegen Aktivkohle oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- bei Vergiftungen (verursacht) durch **starke Säuren, Basen oder Erdöhlaltige** Stoffen;
- vorausgehend an einer inneren **Untersuchung von Speiseröhre oder Magen.**(Endoskopie)

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn Sie noch andere Arzneimittel nehmen worunter auch Antikonzeptiva sollten sie auch die Rubrik „Bei Einnahme von Norit mit anderen Arzneimitteln“ lesen.
- Norit in sehr hohen Dosen eingenommen kann sich mit Verdauungsenzymen und Vitaminen verbinden, Wenn es in sehr hohen Dosen verabreicht wird. Dies kann Anlaß Geben zu **Verdauungsschwierigkeiten und Vitaminmangel.**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt Bevor Sie Norit anwenden.

Einnahme von Norit zusammen mit anderen Arzneimitteln

Norit kann im Darm eine Menge Stoffe an sich binden. Hierdurch können auch Medikamente gebunden und mit dem Stuhlgang mit ausgetrieben werden. Auf dieser Weise wird eine ungenügende Menge Arzneimittel aufgenommen und kann die Wirkung beeinträchtigt werden.

- Nachstehende Produkte können mit Norit verbunden werden: manche **Antibiotika, Blutgerinnungsmittel, Brechmittel.**
- Die Wirkung oraler Antikontrazeptiva (**“die Pille“**) kann bei gleichzeitiger Verabreichung von Aktivkohle gestört werden. Darum sollte man während der Behandlung mit Norit nach einer anderen und verlässlichen Verhütungsmethode vorgehen.
- **Aspirin** (Schmerzmittel und **Blutverdünner**) und **Furosemid** (urineproduktions fördernd Mittel) **können sich auch an Norit binden.** Dosisanpassung dürfte nötig werden.
- **Fenytoin** und **Carbamazepin** (Beide gebraucht bei Fallsucht(Epilepsie))binden sich**auch** an Norit. Bei gleichzeitiger Therapie müssen die Gehalte dieser Arzneimittel kontrolliert werden und Dosisanpassung kann nötig sein.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Einnahme von Norit zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Norit kann Verdauungsenzymen und Vitaminen binden wenn es in sehr hohen Dosen verabreicht wird. Dies kann mitunter Anlaß geben zu Verdauungsschwierigkeiten und Vitaminmangel.

Schwangerschaft und Stillzeit

Norit kann, insofern bekannt, während der Schwangerschaft und Stillzeit problemlos genommen werden.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

Norit enthält Sucrose, Lactose und Natrium

Norit 250 mg Tabletten enthält Zucker wie **Sucrose** und **Lactose** . Bitte nehmen Sie Norit erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Norit 250 mg Tabletten enthält Natrium. Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablet, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

3. WIE IST NORIT EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Wenn keine Besserung auftritt nach 7 Tagen, sollten Sie wiederum Ihren Arzt fragen um Rat.
Nehmen Sie Norit (sowohl Tabletten wie Hartkapseln) immer mit etwas Wasser durch den Mund ein.

	Tabletten(250 mg)	Hartkapseln (200 mg)	Bemerkungen
Durchfall	3 bis 5 Tabletten auf einmal einnehmen Bis dreimal am Tag wiederholen	Jedesmal 3 bis 4 Kapseln einnehmen Bis dreimal am Tag wiederholen (oder öfter wenn nötig)	Die Behandlung mit Norit wenn die Diarrhö vorbei ist einstellen Bei ernster Diarrhö muß das Flüssigkeitsgleichgewicht wiederhergestellt werden. Der Arzt kann dies erreichen indem er Ihnen Salzlösungen einspritzt.
Vergiftungen	Sofort 10 Tabletten einnehmen Einige Malen wiederholen mit kurzen Unterbrechungen	Sofort 10 bis 20 Kapseln einnehmen Einige Malen wiederholen mit kurzen Unterbrechungen	Diese Dosis ist eine vorgeschlagene Dosis. Befolgen Sie immer ganz genau die Hinweise Ihres Arztes. Nach der Einnahme von Norit könnte der Arzt Eine Magenspülung durchführen oder Norit mit Wasser vermischt durch eine Magensonde verabreichen.

Wenn Sie eine größere Menge von Norit angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Norit haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Antgiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Einnahme von Norit vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Norit abbrechen

Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden Nebenwirkungen nach abnehmender Schwere gereiht: sehr häufig ($\geq 1/10$); häufig ($\geq 1/100, < 1/10$); gelegentlich ($\geq 1/1.000, < 1/100$); selten ($\geq 1/10.000, < 1/1.000$); sehr selten ($< 1/10.000$), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Sehr häufig: Schwarz gefärbten Stuhlgang. Es hat keinen schädlichen Einfluss.

Häufig: Brechen und Verstopfung.

Gelegentlich: Magen- und Darm Obstruktion.

Sehr selten: akute Blinddarmentzündung.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über die

Belgien

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, www.afmps.be, Abteilung Vigilanz: Website: www.notifierunefetindesirable.be, E-mail: adr@fagg-afmps.be.

Luxemburg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg. Website : www.guichet.lu/pharmakovigilanz.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST NORIT AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Bei Zimmertemperatur (15- 25° C) aufbewahren in der Originalverpackung.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett, dem Umkarton oder dem Blisterpackung dem Behältnis nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden, wenn Sie Folgendes bemerken: dass die Tabletten verfärbt sind.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Norit enthält

- Der Wirkstoff von Norit 250 mg Tabletten und Norit 200 mg Hartkapseln ist Aktivkohle.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
- Norit 250 mg Tabletten: Sucrose, Lactose, Natrium-Carboxymethylcellulose und Magnesiumstearat.
- Norit 200 mg Hartkapseln: Gelatin, Titandioxid und Eisen-Oxide.

Wie Norit aussieht und Inhalt der Packung

Norit 250 mg Tabletten: Packung mit 75 Tabletten abgepackt in einem Polypropylentablettenbehältnis.

Norit 200 mg Hartkapseln: Packung mit 30 Hartkapseln in Blisterpackung.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Ceres Pharmaceuticals NV
Kortrijksesteenweg 1091 bus B
B-9051 Sint-Denijs-Westrem

Hersteller

Norit Nederland B.V.
Mr. Ovingkanaal O.Z.3
NL-9871 EV Klazienaveen

Zulassungsnummer

Norit 250 mg Tabletten: BE084883

Norit 200 mg Hartkapseln:

BE: BE123837

LU: 2008069824

Ausgabe

Freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 07/2025.