

---

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

### FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G CREME Fusidinsäure und Betamethason

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
  - Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
  - Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter.
- Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. [WAS IST FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G CREME UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?](#)
2. [WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G CREME BEACHTEN?](#)
3. [WIE IST FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G CREME ANZUWENDEN?](#)
4. [WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?](#)
5. [WIE IST FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G CREME AUFZUBEWAHREN?](#)
6. [WEITERE INFORMATIONEN](#)

## 1. WAS IST FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G CREME UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Die Creme enthält ein Antibiotikum (Fusidinsäure) und eine von Cortison abgeleitete entzündungshemmende Substanz (Betamethasonvalerat).

Fucicort Lipid wird zur Behandlung von atopischer Dermatitis eingesetzt, bei der zusätzlich eine bakterielle Infektion aufgetreten ist.

## 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G CREME BEACHTEN?

### **Fucicort Lipid darf nicht angewendet werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Fusidinsäure, Betamethasonvalerat oder einen der sonstigen Bestandteile von Fucicort Lipid sind.
- bei Hautinfektionen, die durch Viren (wie z. B. Herpes simplex, Varizellen, Herpes zoster) oder Pilze verursacht wurden oder in Zusammenhang mit Tuberkulose oder Syphilis aufgetreten sind.
- bei eitrigen bakteriellen Infektionen
- bei Akne vulgaris oder Akne rosacea
- bei Mundrandentzündung (perioraler Dermatitis)
- auf Wunden
- bei Hautverdünnung (Atrophie)

### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Fucicort Lipid ist erforderlich**

- Die Anwendung bei Kindern unter sechs Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden klinischen Erfahrungen mit dieser Patientengruppe vorliegen.
- Eine länger dauernde lokale Behandlung sollte vermieden werden, insbesondere bei kleinen Kindern. Die Anwendung von Fusidinsäure kann zu bakterieller Resistenz führen.
- Cortisonderivate verzögern die Narbenbildung.
- Bei Patienten mit Ulcus cruris (Hautgeschwür), erhöhter Fragilität der Hautgefäße oder Juckreiz (Pruritus) im Bereich von Anus und Genitalien sollte eine Behandlung mit Fucicort Lipid vermieden werden.
- Bei Anwendung in Augennähe ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Creme nicht ins Auge gerät, da ansonsten die Gefahr einer Glaukombildung (Grüner Star) besteht. Der Kontakt mit Augen und Schleimhäuten sollte möglichst vermieden werden.
- Wenn Sie keine Verbesserung oder sogar eine Verschlechterung beobachten, wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt. Wie bei allen starken Cortisonderivaten ist nicht ausgeschlossen, dass es zu einer Verschlimmerung der Infektion kommt.

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn einer der obenstehenden Warnhinweise auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit zutraf.

### **Bei Anwendung von Fucicort Lipid mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen von Fucicort Lipid mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

### **Bei Einnahme bzw. Anwendung von Fucicort Lipid zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Nicht zutreffend.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Die lokale Anwendung von Glucocorticoiden bei trächtigen Tieren kann sich auf die Entwicklung des Fötus' auswirken. Es liegen keine Informationen über die Anwendung bei schwangeren Frauen vor.

Während der Schwangerschaft darf Fucicort Lipid ausschließlich unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden.

Die Anwendung sollte weder in hoher Dosierung noch über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen. Dies gilt besonders für die ersten drei Monate der Schwangerschaft.

Die Anwendung von Fucicort Lipid in der Stillzeit sollte vermieden werden.

Fragen Sie vor der Einnahme oder Anwendung eines Medikaments Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Fucicort Lipid hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Fucicort Lipid**

Fucicort Lipid enthält Cetylstearylalkohol, der lokale Hautreaktionen (wie z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen kann.

Dieses Arzneimittel enthält außerdem Parahydroxybenzoate, die eine allergische Reaktion verursachen können (möglicherweise verzögert).

### 3. WIE IST FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G CREME ANZUWENDEN?

Wenden Sie Fucicort Lipid immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation bzw. nach Anweisung Ihres Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Sollte keine Besserung eintreten, wenden Sie sich erneut an Ihren Arzt.

Der Arzt legt fest, wie Fucicort Lipid angewendet wird.

Normale Dosierung für Erwachsene und Kinder über sechs Jahre: 1 bis 2 Mal am Tag eine kleine Menge auf die betroffene Hautpartie auftragen und, wenn gewünscht, im Anschluss einen Verband anbringen. Die Dauer der Behandlung darf zwei Wochen nicht überschreiten.

#### **Wenn Sie eine größere Menge Fucicort Lipid angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie zu viel Fucicort Lipid angewendet oder Creme verschluckt haben, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, Apotheker oder die Giftnotrufzentrale (070/245 245).

Fälle von Überdosierung sind bisher nicht bekannt. Im Fall einer zu häufigen Anwendung oder Überdosierung können allgemeine Symptome auftreten.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Fucicort Lipid vergessen haben**

Holen Sie die Anwendung zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach und tragen die gewohnte Menge Fucicort Lipid auf. Nehmen Sie nicht die doppelte Menge Creme.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Fucicort Lipid abbrechen**

Nach Absetzen der Behandlung können die Hautbeschwerden wieder auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Fucicort Lipid Nebenwirkungen haben.

- Am häufigsten treten Hautirritationen an der Anwendungsstelle auf.
- Jucken
- Hautirritation
- Brennen oder Kribbeln der Haut
- trockene Haut
- Ausschlag
- Entzündung der Haut
- Hautröte
- Verschlechterung des Ekzems
- Nesselsucht (Urtikaria)
- Hautverdünnung (Atrophie)
- Allergische Reaktionen werden äußerst selten beobachtet.

Bei Anwendung auf empfindlichen Hautstellen wie im Gesicht, im Bereich von Hautfalten und auf dünner Haut kann es in seltenen Fällen zu den folgenden unerwünschten Wirkungen kommen: Haarbalgentzündung (Follikulitis), übermäßiger Haarwuchs (Hypertrichose), Mundrandentzündung (periorale Dermatitis), allergische Kontaktdermatitis, Hautentfärbung (Depigmentierung) sowie allgemeine Symptome.

Lokale Corticosteroide können Hautverdünnung (Atrophie), Hautgefäßerweiterungen (Teleangiectasien) oder Hautstreifenbildung (Striae) verursachen. Dies gilt insbesondere bei längerer Anwendung. Diese Nebenwirkungen wurden bei klinischen Studien mit Fucicort Lipid nicht untersucht.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, oder wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### 5. WIE IST FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G CREME AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 30 °C lagern.

Eine angebrochene Tube ist drei Monate haltbar.

Wenden Sie Fucicort Lipid nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums nicht mehr an. Dieses finden Sie hinter dem Hinweis „Verwendbar bis“. Im Anschluss daran werden Monat und Jahr genannt. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Danach darf Fucicort Lipid nicht mehr verwendet werden.

**Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Massnahme hilft die Umwelt zu schützen.**

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was Fucicort Lipd enthält

- Die Wirkstoffe sind Fusidinsäure-Hemihydrat, entsprechend 20 mg/g Fusidinsäure  
Und Betamethasonvalerat, entsprechend 1 mg/g Betamethason

- Die sonstigen Bestandteile sind Macrogolstearylether-21, Cetylstearylalkohol, weißes Vaseline, dickflüssiges Paraffin, all-rac-alpha-Tocopherol, Hypromellose, Citronensäure-Monohydrat, Methyl(4-hydroxybenzoat), Propyl(4-hydroxybenzoat), Kaliumsorbat, gereinigtes Wasser

### Wie Fucicort Lipid aussieht und Inhalt der Packung

Creme, erhältlich in Tuben mit 5 g, 15 g, 30 g und 60 g.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

*Pharmaceutischer Unternehmer:*

LEO Pharma nv/sa  
Duwijkstraat 17  
B-2500 Lier  
Tel. 03 740 78 68

*Hersteller:*

LEO laboratories Ltd  
285 Cashel Road  
Dublin 12  
Irland

### Zulassungsnummer

BE413585

### Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Januar 2015**