

## Gebrauchsinformation: Information für Patienten

### Ferricure 150 mg, Hartkapseln

Ferri polysaccharat Komplex

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. [WAS IST FERRICURE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?](#)
2. [WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON FERRICURE BEACHTEN?](#)
3. [WIE IST FERRICURE EINZUNEHMEN?](#)
4. [WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?](#)
5. [WIE IST FERRICURE AUFZUBEWAHREN?](#)
6. [INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN](#)

### 1. WAS IST FERRICURE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Dieses Arzneimittel ist ein Mittel gegen Anämie mit eisensaurem Polysaccharatkomplex.

Ferricure ist bei **der Vorbeugung und bei der Behandlung von Anämien aufgrund von Eisenmangel** indiziert bei Kindern ab 12 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen.

### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON FERRICURE BEACHTEN?

**Ferricure darf nicht eingenommen werden,**

- Wenn Sie **allergisch gegen den Ferri polysaccharat Komplex** oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

- Wenn Sie **allergisch auf Weizen**, aufgrund des Vorhandenseins von Weizenstärke.

- Wenn Sie Darmdivertikel oder eine andere Darmobstruktion haben.

- Wenn Sie unter **einer Krankheit leiden**, die zu einer Eisenüberladung führt (Hämochromatose, Hypersiderose).

- Wenn Sie mehrere Bluttransfusionen erhalten haben.

- Wenn Sie unter **einer anderen Art von Anämie als der Eisenmangelanämie leiden**.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Ferricure Hartkapseln einnehmen

- Wenn Sie **andere eisenhaltige Arzneimittel einnehmen**.

- Wenn Sie (oder Ihr Kind) Ferricure zur Behandlung einer Eisenmangelanämie einnehmen, muss auch die Ursache dieser Eisenmangelanämie gesucht und behandelt werden.

- Wenn Sie **bestimmte Laboruntersuchungen geplant haben, da dieses Medikament bestimmte Testergebnisse (Benzidinprobe) verfälschen kann.**

- Eine angemessene Zahnpflege kann das Problem der Zahnverfärbung verhindern oder eliminieren.

- Auf der Grundlage veröffentlichter Daten in der Literatur wurden Verfärbungen der Wand des Gastrointestinaltrakts bei älteren Patienten beobachtet, die an Niereninsuffizienz, Diabetes (abnormal hoher Blutzucker) und/oder erhöhtem Blutdruck (Hypertonie) litten und Arzneimittel für diese Erkrankungen und eine Eisensupplementierung zur Behandlung ihrer Blutarmut erhielten. Diese Verfärbung der Magen-Darm-Wand kann die Magen-Darm-Chirurgie beeinträchtigen. In Anbetracht dieses Risikos, wenn ein chirurgischer Eingriff geplant ist, wird empfohlen, den Chirurgen über die Notwendigkeit einer Eisensupplementierung zu informieren (siehe Abschnitt 4).

### **Kinder und Jugendliche**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Ferricure hartkapseln ist nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren.

### **Einnahme von Ferricure zusammen mit anderen Arzneimitteln.**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder beabsichtigen, diese einzunehmen.

Manche Arzneimittel dürfen nicht gleichzeitig angewendet werden, während andere Arzneimittel spezifische Änderungen erfordern (z. B. im Einnahmezeitpunkt) :

- Wenn Sie (oder Ihr Kind) injizierbare eisenhaltige Arzneimittel einnehmen, sollten Sie die Einnahme von Ferricure vermeiden.

Wenn Sie (oder Ihr Kind) die folgenden Arzneimittel einnehmen, muss zwischen der Einnahme und Ferricure ein Abstand von mindestens 2 Stunden eingehalten werden :

- Antibiotika (Tetracycline, Fluorochinolone),
- Arzneimittel zur Behandlung chronischer Harnwegsinfektionen (Acetohydroxamsäure),
- Arzneimittel zur Behandlung von HIV-Infektionen (Integrasehemmer, Bictegravir),
- Arzneimittel zur Behandlung von Knochenschwäche (Bisphosphonate),
- Arzneimittel zur Behandlung von Gelenkerkrankungen, Morbus Wilson oder zur Vorbeugung von Nierensteinen (Penicillamin, Trientine),
- Arzneimittel gegen übermäßige Magensäure : Gastrointestinale Mineralzubereitungen, Kohle oder Antazida (Aluminium-, Calcium- und Magnesiumsalze),
- Arzneimittel zur Behandlung einer Schilddrüsenerkrankung (Levothyroxin, Liothyronin),
- Arzneimittel zur Behandlung der Parkinson-Krankheit (Methyldopa, Levodopa, Carbidopa, Entacapon),
- Supplement und/oder Arzneimittel, das Zink, Calcium oder Strontium enthält.

Wenn Sie (oder Ihr Kind) Cholestyramin einnehmen, muss Ferricure 1 bis 2 Stunden vor oder 4 bis 6 Stunden nach Cholestyramin eingenommen werden.

### **Bei Einnahme von Ferricure zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Calciumreiche Nahrungsmittel können die Eisenaufnahme im Verdauungstrakt verringern und damit die Wirksamkeit der Behandlung vermindern. Daher sollte die Behandlung nicht zusammen mit Mahlzeiten und Milchprodukten eingenommen werden.[\[A1\]](#)

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit.**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Der tägliche Bedarf an Eisen einer schwangeren, oder stillenden Frau ist nur schwer durch die Nahrungsmittelzufuhr allein abzudecken. Die Verabreichung von Ferricure ergänzt diesen Bedarf.

Es gibt nur wenige Daten zur Eisensupplementierung im ersten Schwangerschaftstrimester, aber es stehen zahlreiche Literaturdaten bei Schwangeren im zweiten und dritten Trimester zur Verfügung. Diese Daten weisen nicht auf eine Toxizität für den Fötus und/oder den Neugeborenen hin.

Daher kann Ferricure während der Schwangerschaft bei klinischer Notwendigkeit angewendet werden.

Dieses Arzneimittel kann während der Stillzeit angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es ist unwahrscheinlich, dass die Anwendung von Ferricure Einfluss auf die Fähigkeit, Fahrzeuge zu führen und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **Ferricure hartkapseln enthält Weizenstärke (Weichweizen).**

Dieses Arzneimittel enthält einen sehr geringen Glutengehalt (aus Weizenstärke). Es gilt als "glutenfrei" und wird daher bei Zöliakie wahrscheinlich keine Probleme verursachen. Eine Kapsel enthält nicht mehr als 11,3 Mikrogramm Gluten. Wenn Sie eine Weizenallergie haben (die sich von Zöliakie unterscheidet), dürfen Sie dieses Arzneimittel nicht einnehmen.

### 3. WIE IST FERRICUREEINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

**Die empfohlene Dosis beträgt:**

**Für Erwachsene**, ist es empfehlenswert zu nehmen 1 Kapsel pro Tag, mit einem Glas Wasser eine halbe Stunde vor der Mahlzeit oder außerhalb der Mahlzeiten einzunehmen. Im Notfall kann die Dosierung von Ferricure auf ein Maximum von 2 Hartkapseln pro Tag in zwei Verabreichungen erhöht werden.

**Für schwangere Frauen** gilt im Allgemeinen, dass Dosen von 40 mg bis 100 mg pro Tag in 80% bis 90% der Fälle wirksam sind, was die Vorbeugung eines Eisenmangels betrifft.

**Für stillende Frauen** beträgt die empfohlene Dosis 10 mg pro Tag.

**Anwendung bei Kindern, schwangere und stillende Frauen**

**Ferricure hartkapseln ist nicht für Kinder unter 12 Jahren empfohlen.**

**Ferricure kommt es im Lösung zum Einnehmen, dieser Präsentation bietet eine bessere Dosierung für Kinder.**

**Dauer der Behandlung:**

Ihr Arzt kann Ihnen sagen, wie lange Sie Ferricure nehmen sollten. Die Behandlung kann mehrere Monate dauern. Befolgen Sie die von Ihrem Arzt vorgeschriebene Dosis und Behandlungsdauer.

**Wenn Sie eine größere Menge von Ferricure eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie versehentlich eine zu große Menge von Hartkapsel geschluckt haben, könnten **die folgenden Symptome auftreten: Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall. Kinder reagieren auf starke Dosierungen empfindlicher.**

Sollten Sie zu viel Ferricure eingenommen haben, rufen Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Entgiftungszentrum an (070/245.245). In diesem Fall brechen **Sie sofort auch die Behandlung ab und nehmen Sie Deferoxamin ein**, das spezifische Mittel gegen einen Eisenüberschuss, und/oder fragen Sie einen Arzt oder Ihren Apotheker um Rat.

**Wenn Sie die Einnahme von Ferricure vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, damit er Ihnen die notwendigen Anweisungen geben kann.

**Wenn Sie die Einnahme von Ferricure abbrechen**

Respektieren Sie die vorgeschriebene Dosis und der Dauer der Behandlung, die von Ihrem Arzt verordnet wurden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel Ferricure kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Sie (oder Ihr Kind) können folgende Nebenwirkungen verspüren, von häufig bis selten geordnet :

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Personen betreffen) :

- Verstopfung
- Durchfall
- Blähbauch
- Bauchschmerzen
- abnormale Stuhlverfärbung
- Übelkeit

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Personen betreffen) :

- Schwellung des Rachens (Larynxödem)
- abnormaler Stuhlgang
- Verdauungsstörung (Dyspepsie)
- Erbrechen
- Entzündung der Magenwand (Gastritis)
- Juckreiz (Pruritus)
- roter Hautausschlag (erythematöser Ausschlag)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar) :

- allergische Reaktion (Überempfindlichkeitsreaktion)
- Hautausschlag mit Juckreiz (Urtikaria)
- Zahnverfärbung
- Verfärbung der Wand des Gastrointestinaltrakts (gastrointestinale Melanose) (siehe Abschnitt 2).

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder, Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das in aufgeführte nationale Meldesystem:

#### Belgien

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Abteilung Vigilanz :

Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

#### Luxemburg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website : [www.guichet.lu/pharmakovigilanz](http://www.guichet.lu/pharmakovigilanz)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden können

## 5. WIE IST FERRICURE AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Aufbewahren bei einer Temperatur von nicht mehr als 30°C.

In der Originalverpackung aufbewahren , geschützt vor Licht und Feuchtigkeit.

Sie dürfen Ferricure nach dem auf dem Umkarton und dem Blisterpackung nach "EXP" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

### Was Ferricure I enthält

Der Wirkstoff ist der Ferri polysaccharat Komplex 326,10 mg (entspricht 150 mg Fe).

Die sonstigen Bestandteile sind Weizenstärke, Gelatine, Magnesiumstearat, rotes Eisenoxid (E172), Titandioxid (E171).

### Wie Ferricure aussieht und Inhalt der Packung

Ferricure Hartkapseln wird in Packungen von 14, 28 und 56 roten Hartkapseln (Blisterpackung mit 14 Hartkapseln) angeboten. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Es ist auch in Form einer Lösung zum Einnehmen erhältlich.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

S.A. Laboratoires Pharmaceutiques Trenker

Avenue Thomas Edison 32 •

BE-1402 Thines- Belgien.

T +32 (0)2 374 02 53

E Mail info@trenker.be

### Abgabeform

Verschreibungspflichtig

**Zulassungsnummer für die Vermarktung: BE102313.**

*Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt überarbeitet im Oktober 2025.*

Das Datum, an dem diese Packungsbeilage zuletzt genehmigt wurde, ist 03/2026

[