

---

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

Zineryt 40 mg/ml / 12 mg/ml,  
Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut

Erythromycin  
Zinkacetatdihydrat

### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Zineryt jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. [WAS IST ZINERYT UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?](#)
2. [WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ZINERYT BEACHTEN?](#)
3. [WIE IST ZINERYT ANZUWENDEN?](#)
4. [WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?](#)
5. [WIE IST ZINERYT AUFZUBEWAHREN?](#)
6. [INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN](#)

### 1. WAS IST ZINERYT UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Zineryt enthält das Antibiotikum Erythromycin in der Form eines Komplexes mit Zink in einer Lösungsmittel, die aus Alkohol besteht und aus einem Stoff, der eine mildernde Auswirkung auf die Haut hat.

Indiziert zur lokalen Behandlung von Akne, insbesondere der meist courante Form von entzündete Geschwüre.

## 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ZINERYT BEACHTEN?

### **Zineryt darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Erythromycin oder andere Antibiotika derselben Gruppe, oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. Diese Bestandteile sind in Abschnitt 6 zu finden.

### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Zineryt ist erforderlich,**

- Zineryt darf nicht ins Auge gelangen und nicht in Berührung mit Schleimhäuten gebracht werden. Sollte dies jedoch passieren, dann bitte sofort mit kaltem oder lauwarmen Wasser einige Minuten lang spülen.

- Der Inhalt der Flasche Zineryt kann beim Kleckern Flecken auf Textilien oder Mobiliar verursachen.

- Wenn Sie noch andere Arzneimittel nehmen, lesen Sie bitte auch den Abschnitt "Bei Anwendung von Zineryt mit anderen Arzneimitteln".

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn einer der oben erwähnten Warnhinweise auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit zugetroffen hat.

### **Anwendung von Zineryt zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Zineryt darf auf der Haut nicht mit Säuren oder Alkali in Berührung kommen.

Jedoch kann Zineryt mit einer Lokalbehandlung mit Vitamin-A-Säure oder Benzoylperoxid oder einer Oralbehandlung mit Tetrazyklin kombiniert werden.

Man soll vorsichtig sein, bei gleichzeitige Anwendung von anderen lokalen Anti-Akne Mitteln, da die Irritation sich verschlechtern kann, insbesondere mit Produkten die die Abschuppung stimulieren.

### **Anwendung von Zineryt zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Keine Information vorhanden.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit**

Zineryt darf während der Schwangerschaft und der Stillzeit verwendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Keine Information vorhanden.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Zineryt**

Nicht zutreffend.

## 3. WIE IST ZINERYT ANZUWENDEN?

Wenden Sie Zineryt immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Man trägt Zineryt zweimal täglich auf die gesamte Gesichtshaut oder auf andere erkrankte Gewebebezirke (auch auf die Umgebung der erkrankten Stellen) auf, vorzugsweise nach dem Waschen.

Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen wie lange Sie Zineryt verwenden müssen. Die übliche Behandlungsdauer ist 10 bis 12 Wochen. In den meisten Fällen wird dann eine zufriedenstellende Besserung festgestellt.

Sie müssen die Behandlung zu Ende führen.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Zineryt angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie zuviel Zineryt verwendet haben, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Giftberatungszentrum (070/245.245) auf. Der Gebrauch zu großer Mengen Zineryts während längerer Zeit wird vermutlich eine Rötung und Austrocknung der Haut zur Folge haben.

Bei oraler Einnahme des gesamten Inhalts einer Packung Zineryt werden hauptsächlich die Vergiftungserscheinungen nach Alkoholgenuss auftreten.

### **Wenn Sie die Anwendung von Zineryt vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

### **Wenn Sie die Anwendung von Zineryt abbrechen**

Keine Information vorhanden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Zineryt Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Durch die Alkoholbasis von Zineryt kann manchmal ein brennendes oder juckendes Gefühl, Abschuppung, oder eine leichte Rötung der Haut festgestellt werden. Dies ist von temporär Art.

Eine Überempfindlichkeit und eine allergische Reaktion auf einen Bestandteil von Zineryt sind nicht ausgeschlossen.

Zineryt, das mit dem Applikator auf die Haut aufgetragen und getrocknet ist, verursacht keine Flecken auf der Haut oder auf der Kleidung, die mit den behandelten Hautpartien in Berührung gekommen ist.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen .

#### Belgien

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte  
Abteilung Vigilanz, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/40  
B-1060 Brüssel

website : [www.fagg-afmps.be](http://www.fagg-afmps.be)

e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

#### Luxemburg

Direction de la Santé  
Division de la Pharmacie et des Médicaments  
Villa Louvigny – Allée Marconi  
L-2120 Luxemburg

Website : <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. WIE IST ZINERYT AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flasche (Pulver und Lösungsmittel) nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach der Mischung ist die Lösung 8 Wochen haltbar bei einer Temperatur nicht über 25°C.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall . Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden.

Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

### Was Zineryt enthält

- Die Wirkstoffe sind: Erythromycin und Zinkacetatdihydrat
- Die sonstigen Bestandteile sind: Diisopropylsebacat und Ethanol

### Wie Zineryt aussieht und Inhalt der Packung

Die Verpackung enthält eine Flasche Pulver, eine Flasche Lösungsmittel und einen Applikator in einer Plastikhalterung. Die Zubereitung der Lotion wird in der Beilage beschrieben.

Nach der Mischung enthält die Flasche mit Applikator 30 ml Zineryt.

### Pharmazeutischer Unternehmer

Astellas Pharma SA  
Erasmus Park  
Square Marie Curie 50 - Gebäude 5 – 1e Etage  
1070 Brüssel

### Hersteller

Astellas Pharma Europe BV  
Sylviusweg 62  
2333 BE Leiden  
Niederlande


**Verkaufsabgrenzung:** Ohne Verschreibung erhältlich.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 09/2014.


### Zubereitung von Zinerytlotion

1. Die Zinerytverpackung enthält:


- Eine Flasche mit breitem Hals, welches das Pulver enthält (A)
- Eine Flasche mit schmalen Hals, das die Lösungsmittel enthält (B)
- Einen Applikator in einer Plastikhalterung (C)




2. Gießen Sie die Lösungsmittel (B) in die Flasche mit Zineryt-Pulver (A) und schrauben Sie den Deckel wieder auf.




3. Schütteln Sie diese Flasche (A) 1 Minute lang gut durch.



4. Nehmen Sie den Deckel von der Flasche (A) ab und öffnen Sie die Plastikhalterung des Applikators (C). Legen Sie die Halterung mit dem Applicator darin auf den Hals der Flasche (A) und DRÜCKEN SIE GUT AN.



5. Entfernen Sie die Plastikhalterung und kontrollieren Sie, ob der Applikator gut und fest sitzt. Drücken Sie nötigenfalls gut an.



6. Die Lösung ist nach der Zubereitung 8 Wochen lang haltbar. Schreiben Sie das Verfalldatum auf das Etikett.