

---

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR Patienten

**Vicks Schleimhusten, 13,33 mg/ml, Sirup**  
Guaifenesin

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. [WAS IST VICKS SCHLEIMHUSTEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?](#)
2. [WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON VICKS SCHLEIMHUSTEN BEACHTEN?](#)
3. [WIE IST VICKS SCHLEIMHUSTEN EINZUNEHMEN?](#)
4. [WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?](#)
5. [WIE IST VICKS SCHLEIMHUSTEN AUFZUBEWAHREN?](#)
6. [INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN](#)

### 1. WAS IST VICKS SCHLEIMHUSTEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Vicks Schleimhusten wird zur Behandlung von Atemwegserkrankungen verwendet, wobei das Abhusten erleichtert wird.

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON VICKS SCHLEIMHUSTEN BEACHTEN?

### Vicks Schleimhusten darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie allergisch gegen Guaifenesin oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie an Porphyrie leiden (Störung des Aufbaus des roten Blutfarbstoffs).
- bei Kindern unter 6 Jahren.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Ein ärztlicher Rat ist erforderlich, wenn:

- Sie seit mehr als einer Woche husten oder einen wiederkehrenden Husten haben,
- Sie einen Husten haben, der viel Schleim (Sputum) produziert,
- Sie einen anhaltenden oder chronischen Husten haben, wie er durch Rauchen, Asthma, Entzündung der Bronchien (chronische Bronchitis) oder ein Lungenemphysem (Verlust der Elastizität des Lungengewebes, verbunden mit Kurzatmigkeit) verursacht wird. In diesem Fall darf das Medikament nicht eingenommen werden.

Sie sollten dieses Arzneimittel nicht länger als 5 Tage ohne ärztliche Anweisung einnehmen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Vicks Schleimhusten einnehmen.

#### **Kinder**

- Nicht verabreichen an Kindern unter 6 Jahren.

#### **Einnahme von Vicks Schleimhusten zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

In einem Labortest kann Guaifenesin die Diagnose von Karzinoid-Syndromen beeinflussen. Daher sollten Sie melden, dass Sie dieses Arzneimittel einnehmen, wenn Sie sich einem Labortest unterziehen müssen.

#### **Einnahme von Vicks Schleimhusten zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Dieses Produkt enthält bis zu 597mg Ethanol (Alkohol) pro Dosis 15 ml, dies entspricht 12 ml Bier oder 5 ml Wein pro Dosis von 15 ml. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

#### **Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit:**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Während der ersten 3 Monate Ihrer Schwangerschaft dürfen Sie Vicks Schleimhusten nicht einnehmen.

Während der Stillzeit dürfen Sie Vicks Schleimhusten nicht einnehmen.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Vicks Schleimhusten kann Schläfrigkeit und Schwindelgefühl hervorrufen. Wenn Sie Schläfrigkeit oder Schwindelgefühl bemerken, fahren Sie keine Fahrzeuge und bedienen Sie keine Maschinen.

#### **Vicks Schleimhusten enthält:**

- **Sucrose und Invertzucker (Honig)**  
Bitte nehmen Sie Vicks Schleimhusten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Dieses Arzneimittel enthält 5,55 g Sucrose pro Dosis (15 ml). Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.
- **Natrium**  
Dieses Arzneimittel enthält 27,9 mg Natrium (Hauptbestandteil von Kochsalz/Speisesalz) pro Dosis von 15 ml. Dies entspricht 1,40 % (2 g) der für einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Natriumaufnahme mit der Nahrung.
- **5,256 Vol.% Ethanol**  
Dieses Arzneimittel enthält 5,256 Vol.% Ethanol (Alkohol), dies entspricht 597 mg pro Dosis von 15 ml. Die Menge pro Dosis von 15 ml dieses Arzneimittels entspricht weniger als 12 ml Bier oder 5 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.
- **Propylenglykol**  
Dieses Arzneimittel enthält 1650 mg Propylenglycol pro Dosis von 15 ml.  
Nehmen Sie dieses Arzneimittel nicht ein, wenn sie schwanger sind oder stillen, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen empfohlen. Ihr Arzt führt möglicherweise zusätzliche Untersuchungen durch, während Sie dieses Arzneimittel einnehmen.  
Nehmen Sie dieses Arzneimittel nicht ein, wenn sie an einer Leber- oder Nierenerkrankung leiden, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen empfohlen. Ihr Arzt führt möglicherweise zusätzliche Untersuchungen durch, während Sie dieses Arzneimittel einnehmen.
- **Natriumbenzoat**  
Dieses Arzneimittel enthält 15 mg Benzoat pro Dosis von 15 ml.

### 3. WIE IST VICKS SCHLEIMHUSTEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis ist:

Kinder bis 6 Jahren	Nicht verabreichen
Kinder von 6 bis 12 Jahren	10 ml 3 bis 4-mal täglich einnehmen. Nicht mehr als 15 ml pro Einnahme und maximal 60 ml in 24 Stunden
Erwachsene und Kinder über 12 Jahren	15 ml 3 bis 4-mal täglich einnehmen. Nicht mehr als 30 ml pro Einnahme und maximal 120 ml in 24 Stunden

Benutzen Sie den beiliegenden Messbecher.

*Verabreichung:* Vor Gebrauch schütteln. Vicks Schleimhusten wird oral eingenommen. Die Behandlungsdauer sollte möglichst kurz sein (nicht länger als 5 Tage ohne ärztliche Anweisung).

**Wenn Sie eine größere Menge von Vicks Schleimhusten eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie zu viel Vicks Schleimhusten angewendet haben, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (☎ 070/245.245).

*Symptome bei Erwachsenen:* Übelkeit, Erbrechen. Bei wiederholter Überdosierung kann es zur Bildung von Nierensteinen kommen.

*Symptome bei Kindern:* Übelkeit, Erbrechen, verminderter Herzschlag, Schwindelgefühl, Blutdrucksenkung. Nach einer Überdosis mit sehr hohen Mengen kann Gliederlähmung auftreten.

**Wenn Sie die Einnahme von Vicks Schleimhusten vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Einnahme von Vicks Schleimhusten abbrechen**

Gegenstandslos.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken, hören Sie auf, das Produkt einzunehmen, und suchen Sie sofort medizinische Hilfe: Allergische Reaktionen, z.B. Hautausschläge, Juckreiz, Schwellung der Lippen, Zunge, des Rachens, des Gesichts oder Atembeschwerden.

Die unerwünschten Wirkungen, die auftreten können, umfassen:

*Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts:* Übelkeit, Verstopfung, Erbrechen und Bauchschmerzen oder Durchfall.

*Erkrankungen des Nervensystems:* möglich leichte Schläfrigkeit und Schwindelgefühl, Kopfschmerzen.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen:

**In Belgien:**

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Abteilung Vigilanz:

Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

**In Luxemburg:**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website : [www.guichet.lu/pharmakovigilanz](http://www.guichet.lu/pharmakovigilanz)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. WIE IST VICKS SCHLEIMHUSTEN AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern. In der Originalpackung aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel, nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei

## 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

### Was Vicks Schleimhusten enthält

- Der Wirkstoff ist: Guaifenesin 13,33 mg/ml.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Sucrose, Propylenglykol, Ethanol 96 % v/v, Natriumcitrat, Natriumcarboxymethylcellulose, Zitronensäure, Polyoxyl 40 stearat, Eisenkraut-Aroma, Honig-Ingwer-Aroma, Natriumbenzoat, Polyethylenoxid, Saccharin-Natrium, Levomenthol, gereinigtes Wasser.

Lesen Sie auch Abschnitt 2 ‚Vicks Schleimhusten enthält‘.

### Wie Vicks Schleimhusten aussieht und Inhalt der Packung

Vicks Schleimhusten ist ein dickflüssiger, gelbe Sirup, verkauft in einer 120 oder 180 ml gelb-braunen Glasflasche mit kindersicherem Verschluss und Messbecher. Nicht alle Packungen sind kommerzialisiert.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

*Pharmazeutischer Unternehmer:*

P&G Health Belgium BV/SRL, Temselaan 100, B-1853 Strombeek-Bever, Belgien, Info: ☎ 0800/15174 (9 - 17 h)

*Hersteller:*

Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Procter & Gamble Straße 1, D-64521 Groß-Gerau, Deutschland

**Dieses Arzneimittel ist unter folgender Nummer zugelassen:** BE172961 - LU: 2011031033

**Abgabe:** *Freie Abgabe.*

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 02/2026**