

## Vicks Trockener Husten

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

**Vicks Trockener Husten, 1,33mg/ml, Sirup**  
Dextromethorphan Hydrobromid

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

**Dieses Arzneimittel kann zu Abhängigkeit führen. Daher sollte die Behandlung von kurzer Dauer sein.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- **Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker vor der Einnahme von Vicks Trockener Husten.**
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 4 bis 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- **Wenn Sie Arzneimittel wie bestimmte Antidepressiva oder Antipsychotika einnehmen, kann Vicks Trockener Husten mit diesen Arzneimitteln in Wechselwirkung treten und Sie können Zustandsänderungen der Psyche (z. B. Erregung, Halluzinationen, Koma) und andere Auswirkungen wie eine Körpertemperatur von über 38 °C, Anstieg der Herzfrequenz, instabiler Blutdruck und Übersteigerung der Reflexe, Muskelsteifheit, Mangel an Koordination und/oder Magen-Darm-Symptome (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) haben.**

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. [WAS IST VICKS TROCKENER HUSTEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?](#)
2. [WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON VICKS TROCKENER HUSTEN BEACHTEN?](#)
3. [WIE IST VICKS TROCKENER HUSTEN EINZUNEHMEN?](#)
4. [WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?](#)
5. [WIE IST VICKS TROCKENER HUSTEN AUFZUBEWAHREN?](#)
6. [INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN](#)

### 1. WAS IST VICKS TROCKENER HUSTEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Vicks Trockener Husten ist ein Arzneimittel zur Behandlung der Symptome von trockenem Husten ohne Schleim.

Wenn Sie sich nach 4 bis 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON VICKS TROCKENER HUSTEN BEACHTEN?

### Vicks Trockener Husten darf nicht eingenommen werden

- Wenn Sie allergisch gegen Dextromethorphan oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bei Probleme mit der Atmung oder Husten durch Asthma. Husten ist in diesen Fällen notwendig um den Atemwege nicht zu blockieren.
- Bei gleichzeitige Behandlung mit Monoaminoxidase-Inhibitoren (Arzneimittel gegen Depressionen) und bis 2 Wochen nach Ende dieser Behandlung.
- Wenn Sie keine Sucrose, Glucose oder Fructose tolerieren.
- Wenn Sie an einer schweren Leberfunktionsstörungen leiden

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Vicks Trockener Husten einnehmen.

- Wenn Sie ein älterer Patient sind, muss die ursprüngliche Dosierung verringert werden.
- Ein produktiver Husten darf nicht unterdrückt werden.
- Wenn Sie bereits andere Arzneimittel nehmen, lesen Sie bitte ebenfalls den Titel "*Einnahme von Vicks Trockener Husten zusammen mit anderen Arzneimitteln*".

### Einnahme von Vicks Trockener Husten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

### Wenden Sie Vicks Trockener Husten nicht an zusammen mit:

- Monoaminoxidase-Inhibitoren (Arzneimitteln gegen Depressionen) und bis 14 Tage nach dem Absetzen der Behandlung.
- Arzneimittel, die den Abbau von Dextromethorphan beeinflussen können, z.B. Arzneimittel wie Fluoxetin, Paroxetin, Sertalin, Fluvoxamin, Amiodaron, Chinidin und Haloperidol.
- Die gleichzeitige Anwendung von Vicks Trockener Husten und Sedativa wie Benzodiazepine oder verwandte Substanzen erhöht das Risiko von Schläfrigkeit, Atembeschwerden (Atemdepression) und Koma, und kann lebensbedrohlich sein. Deshalb kann die gleichzeitige Anwendung nur erwogen werden, wenn andere Behandlungsoptionen nicht möglich sind. Wenn Ihr Arzt jedoch Vicks Trockener Husten zusammen mit Sedativa verschreibt soll er die Dosis und Dauer der gleichzeitigen Behandlung einschränken. Bitte informieren Sie Ihren Arzt über alle Sedativa, die Sie einnehmen und halten Sie sich genau an die Dosisanweisungen Ihres Arztes. Es könnte nützlich sein, einige Freunde oder Verwandte zu informieren, dass sie sich der oben erwähnten Anzeichen und Symptome bewusst sein sollen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn solche Symptome bei Ihnen auftreten.

### Einnahme von Vicks Trockener Husten zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Nehmen Sie nie Vicks Trockener Husten zusammen mit Alkohol ein.

### Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit:

Während Ihrer Schwangerschaft oder Stillzeit dürfen Sie Vicks Trockener Husten nicht einnehmen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:

Vicks Trockener Husten kann Schläfrigkeit und Schwindelgefühl hervorrufen. Wenn Sie Schläfrigkeit und Schwindelgefühl bemerken, fahren Sie keine Fahrzeuge und bedienen Sie keine Maschinen.

### Vicks Trockener Husten enthält:

- **Sucrose und Invertzucker (Honig)**  
Bitte nehmen Sie Vicks Trockener Husten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Dieses Arzneimittel enthält 5.55 g Sucrose pro Dosis. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.
- **Natrium**  
Dieses Arzneimittel enthält 27.9 mg Natrium (Hauptbestandteil von Kochsalz/Speisesalz) pro Dosis von 15 ml. Dies entspricht 1.40% der für einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Natriumaufnahme mit der Nahrung.
- **5 Vol.% Alkohol**  
Dieses Arzneimittel enthält 592 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosis von 15 ml. Die Menge pro Dosis von 15 ml dieses Arzneimittels entspricht weniger als 12 ml Bier oder 5 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.
- **Propylenglykol**  
Dieses Arzneimittel enthält 850.50 mg Propylenglycol pro Dosis von 15 ml.  
Nehmen Sie dieses Arzneimittel nicht ein, wenn sie schwanger sind oder stillen, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen empfohlen. Ihr Arzt führt möglicherweise zusätzliche Untersuchungen durch, während Sie dieses Arzneimittel einnehmen.  
Nehmen Sie dieses Arzneimittel nicht ein, wenn sie an einer Leber- oder Nierenerkrankung leiden, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen empfohlen. Ihr Arzt führt möglicherweise zusätzliche Untersuchungen durch, während Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

- **Natriumbenzoat**  
Dieses Arzneimittel enthält 15 mg Benzoat pro Dosis von 15 ml.

### 3. WIE IST VICKS TROCKENER HUSTEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

*Die empfohlene Dosis beträgt:*

**Erwachsene und Kinder über 12 Jahren :**

15ml, 3 bis 4 mal täglich einnehmen.

**Nicht mehr als 22.5ml pro Einnahme und maximal 90ml in 24 Stunden.**

**Kinder unter 12 Jahren:**

Nicht verabreichen, ausgenommen auf ärztlichen Rat.

*Verabreichung:*

Vicks Trockener Husten wird durch den Mund (oral) eingenommen. Vor Gebrauch schütteln. Benutzen Sie den beiliegenden Messbecher.

*Behandlungsdauer:*

Verwenden Vicks Trockener Husten nicht länger als 3 bis 5 Tage ohne ärztlichen Rat.

*Pädiatrische Population*

Bei Kindern können im Falle einer Überdosierung schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auftreten, einschließlich neurologischer Störungen. Pflegepersonen sollten die empfohlene Dosis nicht überschreiten.

**Wenn Sie eine größere Menge von Vicks Trockener Husten eingenommen haben, als Sie sollten.**

Wenn Sie eine größere Menge von Vicks Trockener Husten eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (☎ 070/245.245).

Wenn Sie mehr von Vicks Trockener Husten einnehmen, als Sie sollten, können bei Ihnen folgende Symptome auftreten: Übelkeit und Erbrechen, unwillkürliche Muskelkontraktionen, Unruhe, Verwirrung, Schläfrigkeit, Bewusstseinsstörungen, unwillkürliche und schnelle Augenbewegungen, Herzstörungen (schneller Herzschlag), Koordinationsstörungen, Psychosen mit visuellen Halluzinationen, Übererregbarkeit und verschwommene Sicht.

Andere Symptome im Falle einer massiven Überdosierung können sein: Koma, schwere Atemprobleme und Krämpfe.

Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder Ihr Krankenhaus, wenn eines der oben genannten Symptome bei Ihnen auftritt.

**Wenn Sie die Einnahme von Vicks Trockener Husten vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Einnahme von Vicks Trockener Husten abbrechen:**

Gegenstandslos.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Erkrankungen des Immunsystems	Anaphylaxis (allgemeine allergische Reaktion)
Psychiatrische Erkrankungen	Verwirrtheit und Erregung. Psychotische und manische Symptome oder visuelle Halluzinationen durch Überdosierung .
Erkrankungen des Nervensystems	Schläfrigkeit, Schwindelgefühl
Augenerkrankungen	Erweiterte Pupillen
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums	Bronchospasmus
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	Übelkeit, Verstopfung, Erbrechen, Durchfall
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	Ausschlag , Juckreiz, Urticaria, lokales Kehlschwellung (ödem).

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen in **Belgien** auch direkt über die Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte – [www.afmps.be](http://www.afmps.be) - Abteilung Vigilanz - Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be) - E-Mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be) anzeigen, beziehungsweise in **Luxemburg** über die Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg - Website: [www.guichet.lu/pharmakovigilanz](http://www.guichet.lu/pharmakovigilanz).

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. WIE IST VICKS TROCKENER HUSTEN AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.  
Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Box und der Flasche nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

### Was Vicks Trockener Husten enthält

**Der Wirkstoff** ist Dextromethorphan Hydrobromid 1,33mg/ml.

**Die sonstigen Bestandteile** sind Sucrose, Natrium saccharin, Propylenglykol, Ethanol 96% v/v, Natriumcitrat, Zitronensäure, Natriumcarboxymethylcellulose, Polyethylenoxid, Honig Aroma (Propylenglykol, Honig, Honig Aroma, Karamel), Methoxypropandiol, Polyoxylstearat 40, Natriumbenzoat, Eisenkraut Aroma, gereinigtes Wasser (siehe Abschnitt "Vicks Trockener Husten enthält").

### Wie Vicks Trockener Husten aussieht und Inhalt der Packung

Vicks Trockener Husten ist ein honigfarbener Sirup in einer 120 oder 180 ml Flasche in braunem oder undurchsichtigem Glas mit kindergesichertem Verschluss und Messbecher.

Nicht alle Packungen sind kommerzialisiert.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

*Pharmazeutischer Unternehmer:*

P&G Health Belgium BV/SRL

Temselaan 100

B-1853 Strombeek-Bever

Belgien

Info: ☎ 0800/15174 (9 - 17 h)

*Hersteller:*

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Procter & Gamble Straße 1

D-64521 Groß-Gerau

Deutschland

**Dieses Arzneimittel ist unter folgender Nummer zugelassen:** BE172952 - LU: 2013110427

**Abgabe:** Freie Abgabe

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 02/2026**