

NOTICE : INFORMATION DU PATIENT

ALLEGRA TAB 120 mg comprimés pelliculés

Chlorhydrate de fexofénadine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien

Que contient cette notice ?

1. QU'EST-CE QUE ALLEGRA TAB ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALLEGRA TAB
3. COMMENT UTILISER ALLEGRA TAB
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS
5. COMMENT CONSERVER ALLEGRA TAB
6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

1. QU'EST-CE QUE ALLEGRA TAB ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Allegra tab contient du chlorhydrate de fexofénadine, un antihistaminique non somnolent.

Allegra tab 120 mg est utilisé chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans pour soulager les symptômes de rhinite allergique (par exemple rhume des foins) tels qu'éternuements, nez bouché, qui coule ou qui démange, yeux rouges ou larmoyants.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALLEGRA TAB

Ne prenez jamais Allegra tab:

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Allegra tab .

- Si vous avez des problèmes de foie ou de reins
- Si vous souffrez ou avez souffert de problèmes cardiaques, car ce médicament peut donner lieu à des battements cardiaques rapides ou irréguliers.
- Si vous êtes une personne âgée.

Si un des points ci-dessus vous concerne ou si vous n'en êtes pas sûr, parlez-en avec votre médecin avant de prendre Allegra tab.

Autres médicaments et Allegra tab

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Si vous prenez de l'apalutamide (un médicament pour traiter le cancer de la prostate), car l'effet de la fexofénadine peut être diminué.

Les médicaments contre l'indigestion contenant de l'aluminium ou du magnésium peuvent affecter l'action d'Allegra tab, en diminuant la quantité de médicament absorbée.

Il est recommandé de respecter un délai de deux heures entre le moment où vous prenez Allegra tab et le moment où vous prenez le médicament contre l'indigestion.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ne prenez pas Allegra tab si vous êtes enceinte, sauf si c'est nécessaire.

Allegra tab n'est pas recommandé pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable qu'Allegra tab affecte votre capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines. Assurez-vous cependant que les comprimés ne provoquent pas de somnolence ou de vertiges avant de conduire ou d'utiliser des machines.

Allegra tab contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT UTILISER ALLEGRA TAB

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Médicament destiné aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans

La dose recommandée est de 1 comprimé (120 mg) 1 fois par jour.

Le comprimé doit être pris avec un peu d'eau, avant un repas.

Ce médicament commence à soulager vos symptômes dans l'heure et pendant 24 heures.

Si vous avez utilisé plus de Allegra tab que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de comprimés, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070 / 245 245). Les symptômes de surdosage chez des adultes sont des vertiges, une somnolence, une fatigue et une sécheresse de bouche.

Si vous oubliez de prendre Allegra tab

Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

Prenez la dose suivante au moment habituel, comme prescrit par votre médecin.

Si vous arrêtez de prendre Allegra tab

Avertissez votre médecin si vous souhaitez arrêter de prendre Allegra tab avant la fin du traitement.

Si le traitement par Allegra tab est arrêté plus tôt que prévu, les symptômes peuvent réapparaître.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Arrêtez le traitement par Allegra tab et avertissez immédiatement votre médecin si vous présentez le suivant :

- un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge et des difficultés à respirer car il peut s'agir de signes d'une réaction allergique sévère.

Les effets indésirables suivants ont été signalés lors d'essais cliniques, avec une incidence similaire à celle observée chez des patients qui n'ont pas reçu le médicament (placebo).

Effets indésirables fréquents (peut affecter 1 sur 10 patients):

- maux de tête
- somnolence
- nausées
- vertiges.

Effets indésirables peu fréquents (peut affecter 1 sur 100 patients):

- Fatigue / envie de dormir

D'autres effets indésirables (fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles) pouvant survenir sont :

- difficultés à dormir (insomnies)
- troubles du sommeil
- cauchemars
- nervosité
- battements cardiaques rapides ou irréguliers
- diarrhée
- éruptions cutanées et démangeaisons
- urticaire
- réactions allergiques sévères pouvant provoquer un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, rougeur du visage, oppression dans la poitrine et des difficultés à respirer
- vision trouble.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé – Division Vigilance – Boîte Postale 97 – 1000 Bruxelles Madou – Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be – E-mail : adr@afmps.be

Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé. Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ALLEGRA TAB

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Allegra tab 120 mg

- La substance active est le chlorhydrate de fexofénadine. Chaque comprimé contient 120 mg de chlorhydrate de fexofénadine.

- Les autres composants sont:

Noyau du comprimé: cellulose microcristalline, amidon prégélatinisé, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

Enrobage: hypromellose, povidone K30, dioxyde de titane (E171), silice colloïdale anhydre, macrogol 400, oxyde de fer rouge (E172) et oxyde de fer jaune (E172).

Aspect de Allegra tab 120 mg et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés pelliculés Allegra tab à 120 mg de 6.1 x 15.8 mm sont des comprimés oblongs, de couleur pêche, gravé « 012 » sur une face et « e » sur l'autre.

Allegra tab est présenté en plaquettes. Chaque comprimé est emballé séparément dans une alvéole.

Allegra tab est disponible en emballages de 30 comprimés.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Sanofi Belgium

Leonardo Da Vincilaan 19

1831 Diegem

Tel.: 02/710.54.00

e-mail : info.belgium@sanofi.com

Fabricant

- Opella Healthcare International SAS - 56, route de Choisy - 60200, Compiègne, France

- Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 Avenue G. Eiffel - 37100 Tours – France

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

BE190312

LU : 2008069843

Mode de délivrance

Délivrance libre : boîte de 30 comprimés

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:

Autriche: Allegra 120 mg-Filmdabletten

Belgique: Allegra tab 120 mg comprimés pelliculés

Croatie: Allegra 120 mg filmom obložene tablete

Danemark: Telfast, fillovertrukne tabletter 120 mg

Estonie: Allegra

Finlande: Telfast 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Allemagne: Telfast 120 mg-Filmdabletten

Grèce: Allegra

Irlande: Telfast 120 mg film-coated tablets

Italie: Telfast 120 mg compresse rivestita con film

Lettonie: Allegra 120 mg apvalkotās tabletes

Lituanie: Allegra 120 mg plėvele dengtos tabletės

Luxembourg: Allegra tab 120 mg comprimés pelliculés

Malte: Telfast 120 mg film-coated Tablets

Portugal: Telfast 120, comprimidos revestidos por película

Roumanie: Telfast 120 mg comprimate filmate

Slovénie: Telfast 120 mg filmsko obložene tablete

Slovaquie: Allegra 120 mg

Espagne: Telfast 120 mg comprimidos recubiertos con película

Suède: Allegra

Royaume-Uni: Telfast 120 mg film-coated tablets

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2023 .

En scannant le QR code sur la boîte avec votre smartphone, vous obtiendrez des informations détaillées et mises à jour sur ce produit. Les mêmes informations sont disponibles sur l'URL suivant : <https://www.e-compendium.be/fr/notices/patient/3411/19244>