NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G, CRÈME
Acide fusidique et bétaméthasone

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. QU'EST-CE QUE FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G, CRÈME ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G, CRÈME
3. COMMENT UTILISER FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G, CRÈME
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS
5. COMMENT CONSERVER FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G, CRÈME
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G, CRÈME ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

Fucicort Lipid est une crème avec un antibiotique (acide fusidique) et une substance anti-inflammatoire dérivée de la cortisone (valérate de bétaméthasone).

Fucicort Lipid est indiqué en cas d'affections cutanées atopiques où il se produit également une infection par bactéries.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G, CRÈME

N'utilisez jamais Fucicort Lipid
• Si vous êtes hypersensible (allergique) à l'acide fusidique, au valérate de bétaméthasone ou à l'un des autres composants de Fucicort Lipid.
• Si vous avez une affection cutanée qui est causée par des virus (comme herpes simplex, varicella, zona), des champignons, la tuberculose ou la syphilis.
• Si vous avez des infections bactériennes purulentes.
• En cas d'acné vulgaire ou rosacé.
• En cas d'inflammation cutanée autour de la bouche.
• Sur des blessures.
• Sur une peau amincie (atrophie cutanée).

Faites attention avec Fucicort Lipid
• L'utilisation chez des enfants de moins de 6 ans n'est pas recommandée en raison du manque d'informations cliniques pour ce groupe de patients.
• Il convient d'éviter une thérapie locale prolongée, surtout chez les jeunes enfants. On a signalé une résistance bactérienne lors de l'utilisation d'acide fusidique.
• Les dérivés de la cortisone ralentissent la cicatrisation.
• Si vous avez un ulcère cutané, des veines cutanées vulnérables ou des démangeaisons à l'anus ou aux parties génitales. Dans ces cas, il vaut mieux ne pas utiliser Fucicort Lipid.
• Si vous utilisez la crème à proximité des yeux. Si Fucicort Lipid pénètre dans les yeux, il peut provoquer une cataracte (glaucome). Evitez tout contact avec les yeux ou les muqueuses.
• S'il ne se produit pas d'amélioration, ou par contre une aggravation. Dans ce cas, vous devez consulter votre médecin. Comme pour tous les puissants dérivés de la cortisone, il n'est pas exclu que l'infection s'aggrave.

Veuillez consulter votre médecin si l'une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Prise d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

On ne connaît pas d'interactions avec Fucicort Lipid.

Aliments et boissons
N'est pas d'application.

Grossesse et allaitement
L'administration locale de glucocorticoïdes à des animaux gravides peut provoquer des anomalies du développement fœtal. Il n'existe pas d'informations sur l'utilisation chez la femme enceinte.
Au cours de la grossesse, Fucicort Lipid peut être utilisé exclusivement sous un contrôle médical strict.
Evitez l'utilisation en grandes quantités ou pendant des périodes prolongées, en particulier pendant les 3 premiers mois de la grossesse.

Il convient d'éviter l'emploi de Fucicort Lipid pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Fucicort Lipid n'a pas d'influence, ou un effet négligeable, sur la capacité de conduire un véhicule et d'utiliser des machines.

Informations importantes concernant certains composants de Fucicort Lipid
Fucicort Lipid contient de d'alcool cétostéarylique; cette substance peut provoquer des réactions cutanées locales (p. ex. une dermatite de contact).
Ce médicament contient également des parahydroxybenzoates, qui peuvent provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

3. COMMENT UTILISER FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G, CRÈME

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Si aucune amélioration n'apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin.

La façon dont Fucicort Lipid doit être utilisé est déterminée par le médecin.
La dose usuelle pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans est la suivante : 1 à 2 fois par jour, appliquer une petite quantité sur la peau touchée, avec ou sans pansement. Un traitement ne peut pas durer plus de 2 semaines.

Si vous avez utilisé plus de Fucicort Lipid que vous n'auriez dû
Si vous avez utilisé trop de Fucicort Lipid, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison (070/245.245).

Il n'a pas été décrit jusqu'ici des cas de surdosage. En cas d'applications trop nombreuses ou en trop grandes quantités, il peut se produire des effets généraux.

Si vous oubliez d'utiliser Fucicort Lipid
Dans ce cas, vous devez appliquer la quantité usuelle de Fucicort Lipid lors de la fois suivante prévue.
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Fucicort Lipid
Après l'arrêt du traitement, il est possible que l'affection cutanée récidive.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Fucicort Lipid peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

• L'effet indésirable le plus fréquent est une irritation à l'endroit d'application.
• Démangeaisons
• Irritation cutanée
• Sensation de brûlure et de picotement de la peau
• Peau sèche
• Éruption
• Inflammation cutanée
• Rougeur de la peau
• Aggravation d'un eczéma
• Urticaire
• Amincissement de la peau
• Les réactions allergiques sont extrêmement rares.

En cas d'utilisation sur des zones sensibles de la peau, comme dans le visage, dans les plis et sur une peau mince, les effets indésirables suivants peuvent se produire, mais rarement : inflammation des follicules (folliculite), croissance anormalement forte des poils (hypertrichose), inflammation cutanée autour de la bouche, inflammation cutanée allergique, décoloration de la peau et effets généraux.
Les corticostéroïdes locaux peuvent provoquer une atrophie cutanée, des télangiectasies ou des vergetures, surtout après une application prolongée.
Il n'a pas été mené d'études sur l'utilisation prolongée de Fucicort Lipid.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G, CRÈME

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Un tube ouvert peut être conservé pendant 3 mois.

Ne pas utiliser Fucicort Lipid après la date de péremption mentionnée sur la boîte et le tube après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Fucicort Lipid
- Les substances actives sont hémihydrate d'acide fusidique, correspondant à 20 mg/g d'acide fusidique anhydre et valérate de bétaméthasone, correspondant à 1 mg/g de bétaméthasone

- Les autres composants sont Stéareth-21, alcool cétostéarylique, paraffine blanche molle, paraffine liquide, all-rac-alpha-tocophérol, hypromellose, acide citrique monohydraté, méthylparahydroxybenzoate, propylparahydroxybenzoate, sorbate de potassium, eau purifiée

Qu'est ce que Fucicort Lipid et contenu de l'emballage extérieur
Crème, disponible en tubes de 5 g, 15 g, 30 g et 60 g.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:
LEO Pharma N.V./S.A.
Duwijckstraat 17
B-2500 Lier
Tél.: 03/740 78 68

Fabricant:
LEO laboratories Ltd
285 Cashel Road
Dublin 12
Irlande

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché
BE413585

Mode de délivrance
Médicament soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Janvier 2015