

**Notice : information du patient**

**LACTEOL 170 mg, gélule**

*Lactobacillus acidophilus* inactivés et milieu de culture fermenté

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 jours.

## Que contient cette notice ?

1. QU'EST-CE QUE LACTEOL 170 MG, GÉLULE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LACTEOL 170 MG, GÉLULE ?
3. COMMENT PRENDRE LACTEOL 170 MG, GÉLULE ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER LACTEOL 170 MG, GÉLULE
6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### 1. Qu'est-ce que LACTEOL 170 mg, gélule et dans quel cas est-il utilisé ?

**Qu'est-ce que LACTEOL 170 mg, gélule?**

LACTEOL 170 mg, gélule contient des *lactobacillus* qui sont des bactéries normalement présentes dans le tube digestif.

**Dans quel cas LACTEOL 170 mg, gélule est-il utilisé ?**

LACTEOL 170 mg, gélule est utilisé pour traiter la diarrhée chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte en complément d'une réhydratation et/ou de mesures diététiques.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LACTEOL 170 mg, gélule ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **Ne prenez jamais LACTEOL 170 mg, gélule :**

- si vous ou votre enfant êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous ou votre enfant souffrez d'une intolérance au lactose.
- si vous ou votre enfant avez une salmonellose, infection causée par des bactéries appelées salmonelles.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre LACTEOL 170 mg, gélule.

### **Vous devez consulter votre médecin dans le cas suivant :**

si vous ne constatez aucune amélioration de la diarrhée au bout de 2 jours de traitement.

### **Vous devez consulter rapidement votre médecin si vous êtes dans l'une des situations suivantes :**

- en cas de fièvre et de vomissements,
- en cas de présence de sang dans les selles ou de selles visqueuses (présence de glaires),
- en cas de soif intense ou de sensation de bouche sèche. Ces signes montrent un début de déshydratation causée par une perte importante de liquide.

### **Autres médicaments et LACTEOL 170 mg, gélule**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris tout autre médicament.

### **LACTEOL 170 mg, gélule avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **LACTEOL 170 mg, gélule contient du lactose.**

Ce médicament contient un sucre (le lactose). Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## 3. Comment prendre LACTEOL 170 mg, gélule ?

### **Posologie**

La dose recommandée est de 2 à 4 gélules par jour, en fonction de l'intensité de vos troubles.

Chez les nourrissons, la dose recommandée est de 2 gélules par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de LACTEOL 170 mg, gélule est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

### **Mode d'administration**

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Avalez la gélule avec un demi-verre d'eau.

Chez les enfants de moins de 3 ans, la gélule peut être ouverte et le contenu de la gélule versé et mélangé dans un peu d'eau.

### **Si vous avez pris plus de LACTEOL 170 mg, gélule que vous n'auriez dû :**

Si vous avez utilisé ou pris trop de LACTEOL 170 mg, gélule, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

### **Si vous oubliez de prendre LACTEOL 170 mg, gélule :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

### **Si vous arrêtez de prendre LACTEOL 170 mg, gélule**

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Site internet: [www.afmps.be](http://www.afmps.be)

e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. Comment conserver LACTEOL 170 mg, gélule

- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.
- Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

### Ce que contient LACTEOL 170 mg, gélule

#### - Les substances actives sont :

- *Lactobacillus acidophilus* inactivés (5 milliards)
- Milieu de culture fermenté (neutralisé) (80 mg)

soit 170 mg de substances actives pour une gélule.

- **Les autres composants sont :** acide silicique, talc, stéarate de magnésium, lactose anhydre, lactose monohydraté, carbonate de calcium.  
Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, eau, dioxyde de titane.

### Qu'est ce que LACTEOL 170 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme d'une gélule. Chaque boîte contient 20 gélules.

### Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

ADARE Pharmaceuticals SAS

Route de Bû

78550 Houdan

France

### Représentant local

TRAMEDICO N.V.

Walgoedstraat 12A

9140 Temse

Belgique

### Numéro d'Autorisation de mise sur le marché

BE134294

### Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est le Novembre 2015.