

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Zineryt 40 mg/ml / 12 mg/ml,
poudre et solvant pour solution pour application cutanée

érythromycine
acétate de zinc dihydraté

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. [QU'EST-CE QUE ZINERYT ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE](#)
2. [QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ZINERYT](#)
3. [COMMENT UTILISER ZINERYT?](#)
4. [QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS](#)
5. [COMMENT CONSERVER ZINERYT?](#)
6. [CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS](#)

1. QU'EST-CE QUE ZINERYT ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

Zineryt contient un antibiotique, de l'érythromycine complexé à du zinc dans un solvant composé d'alcool et d'une substance à action émollissante sur la peau.

Indiqué dans le traitement local de l'acné, en particulier, la forme courante des follicules infectés.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ZINERYT

N'utilisez jamais Zineryt

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'érythromycine ou à un autre antibiotique du même groupe, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Evitez de mettre Zineryt au contact des yeux ou des muqueuses. Si tel est cependant le cas, rincer immédiatement avec de l'eau froide ou tiède durant quelques minutes.
 - Lorsque vous renversez le contenu du flacon Zineryt, celui-ci peut provoquer des taches sur du textile ou du mobilier.
 - Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique "autres médicaments et Zineryt".
- Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Autres médicaments et Zineryt

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Zineryt ne peut être mis en contact sur la peau avec des acides ou des alcalis.

Cependant, Zineryt peut être combiné avec un traitement local de vitamine

A-acide ou de benzoylperoxyde ou avec un traitement à la tétracycline par voie orale.

La prudence s'impose lors de l'administration locale simultanée avec des autres produits anti-acné. L'irritation peut s'aggraver, en particulier avec des produits exfoliants.

Zineryt avec des aliments et des boissons

Pas d'information disponible.

Grossesse, allaitement et fécondité

Zineryt peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Pas d'information disponible.

Informations importantes concernant certains composants de Zineryt

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER ZINERYT?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

On applique Zineryt 2 x par jour, sur tout le visage ou sur les autres régions affectées (également l'entourage des lésions), de préférence après la toilette.

Votre médecin vous informera de la durée nécessaire du traitement. La durée habituelle d'un traitement est de 10 à 12 semaines. Dans la plupart des cas, on observe alors une amélioration satisfaisante.

Il faut terminer entièrement le traitement.

Si vous avez utilisé plus de Zineryt que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop de Virazole, prenez contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre anti-poison (070.245.245).

Un surdosage prolongé de Zineryt provoquera probablement des rougeurs et un dessèchement de la peau.

L'absorption de tout le contenu d'un flacon de Zineryt, se traduira surtout par des effets toxiques dus à l'alcool.

Si vous avez oublié d'utiliser Zineryt

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Zineryt

Pas d'information disponible.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Zineryt peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Suite à la présence d'alcool dans le Zineryt, on peut parfois ressentir de l'échauffement ou des picotements, ou noter une desquamation ou une légère rougeur de la peau. Ceci est de nature temporaire.

Une hypersensibilité et une réaction allergique à un des constituants de Zineryt ne sont pas impossibles.

Après application cutanée au moyen de l'applicateur et évaporation, le Zineryt n'occasionne pas de taches sur la peau ou sur les vêtements qui entrent en contact avec la peau traitée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

Belgique

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta, 40/40

B-1060 Bruxelles

site internet : www.afmps.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxembourg

Direction de la Santé

Division de la Pharmacie et des Médicaments

Villa Louvigny – Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

site internet : <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ZINERYT?

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon (poudre et solvant) après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Après mélange, la solution se conserve 8 semaines à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Que contient Zineryt

- Les substances actives sont: l'érythromycine et l'acétate de zinc dihydraté
- Les autres composants sont: le sébacate de diisopropyle et l'éthanol

Qu'est ce que Zineryt et contenu de l'emballage extérieur

Un emballage de Zineryt contient un flacon de poudre, un flacon de solvant et un applicateur dans un étui en plastique. La préparation de la lotion est décrite en annexe.

Après mélange, le flacon avec applicateur contient 30 ml de Zineryt.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Astellas Pharma SA

Parc Erasme

Square Marie Curie 50 - Immeuble 5 – 1e étage

1070 Bruxelles

Fabricant

Astellas Pharma Europe BV

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Pays-Bas

Mode de délivrance : Délivrance libre


Numéro d'Autorisation de Mise sur le Marché : BE126734

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2014.


Préparation de la lotion Zineryt

1. L'emballage de Zineryt contient :


- un flacon à large goulot contenant de la poudre (A)
- un flacon à goulot étroit contenant le solvant (B)
- un applicateur dans un étui en plastique (C)




2. Versez le solvant (B) dans le flacon de Zineryt poudre (A) et revissez le bouchon.




3. Agitez immédiatement et soigneusement ce flacon (A) durant 1 minute.



4. Enlevez le bouchon du flacon (A) et ouvrez l'étui en plastique de l'applicateur (C). Apportez l'étui contenant l'applicateur sur le col du flacon (A) et **APPUYEZ FERMEMENT**.



5. Enlevez l'étui en plastique et contrôlez si l'applicateur est bien enfoncé. Appuyez si nécessaire.



6. La solution ainsi préparée se conserve 8 semaines. Inscrire la date de péremption sur l'étiquette.