

**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**

**Polydexa solution pour instillation auriculaire**

Néomycine, Polymyxine, Dexaméthasone

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Polydexa solution pour instillation auriculaire et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Polydexa solution pour instillation auriculaire
3. Comment utiliser Polydexa solution pour instillation auriculaire
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Polydexa solution pour instillation auriculaire
6. Informations supplémentaires

## Que contient cette notice ?

1. [QU'EST CE QUE POLYDEXA SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE](#)
2. [QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER POLYDEXA SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE](#)
3. [COMMENT UTILISER POLYDEXA SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE](#)
4. [QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS](#)
5. [COMMENT CONSERVER POLYDEXA SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE](#)
6. [INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES](#)

## 1. QU'EST CE QUE POLYDEXA SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE

Médicament contre les infections accompagnées d'inflammation de l'oreille externe.

Polydexa est indiqué dans le traitement des infections du conduit externe des oreilles avec inflammation, sensibles à la polymyxine ou à la néomycine, par exemple, en cas d'otite externe, de furoncle, d'eczéma infecté.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER POLYDEXA SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE

### N'utilisez jamais Polydexa

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans Polydexa.
- Si vous souffrez d'une perforation du tympan.
- Si vous souffrez d'une infection due à des champignons ou à des virus (par exemple herpès) du conduit auditif externe ou du tympan.

### Faites attention avec Polydexa

- Avant d'utiliser Polydexa, vous devez consulter votre médecin qui devra contrôler l'état de vos tympans. En cas de perforation du tympan, l'emploi du médicament est dangereux car il risque de provoquer une surdité ou des troubles de l'équilibre.
- Vous ne pouvez pas administrer Polydexa sous pression dans l'oreille car vous pourriez endommager le tympan.
- L'administration d'antibiotiques locaux participe à la survenue de sensibilisation à ces substances actives, avec possiblement la survenue de réactions générales.
- Polydexa contient un corticoïde (la dexaméthasone), qui n'empêche pas les manifestations d'allergie à l'antibiotique, mais qui peut modifier les symptômes d'une allergie provoquée par les antibiotiques (la néomycine et la polymyxine). Cela peut rendre difficile le diagnostic de ce type d'allergie.
- Interrompre le traitement dès les premiers signes d'apparition d'un rash cutané ou de tout autre signe d'hypersensibilité locale ou générale.
- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- Au moment de l'emploi, éviter la mise en contact de l'embout avec l'oreille ou les doigts afin de limiter les risques de contamination.
- Il est conseillé de ne pas associer ce médicament à un autre traitement local.
- Dans les maladies où Polydexa est indiqué, il peut se produire une surinfection provoquée par des microbes qui résistent à l'action de Polydexa.
- Si vous n'observez pas d'amélioration après 10 jours de traitement ou si vous observez une aggravation, il faut revoir votre médecin pour réévaluer la pathologie et le traitement.
- Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels.

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous ou si elle l'a été dans le passé.

### Utilisation d'autres médicaments

Veillez avertir votre médecin si vous prenez ou avez pris récemment tout autre médicament, y compris des médicaments obtenus sans prescription.

Certains médicaments peuvent augmenter les effets de Polydexa et il est possible que votre médecin souhaite vous surveiller attentivement si vous prenez ces médicaments (y compris certains médicaments pour traiter l'infection à VIH : ritonavir, cobicistat).

Aucune interaction entre Polydexa et d'autres médicaments n'est connue à ce jour.

### Aliments et boissons

Polydexa doit être administré dans l'oreille. Il n'y a donc pas d'interaction possible avec les aliments ou les boissons.

### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Si vous êtes enceinte, et surtout au cours des trois premiers mois de la grossesse, n'employez pas Polydexa.

Vous pouvez utiliser Polydexa si vous allaitez.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Polydexa n'a pas d'influence sur la conduite d'un véhicule ni sur l'utilisation de machines.

### Informations importantes concernant certains composants de Polydexa

Ce médicament contient du thiomersal. Ceci peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple eczéma) et une dépigmentation.

### 3. COMMENT UTILISER POLYDEXA SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est:

Adultes: versez 1 à 5 gouttes dans le conduit auditif, une à trois fois par jour.

#### Utilisation chez les enfants

Versez 1 ou 2 gouttes dans le conduit auditif, une à trois fois par jour.

#### Mode d'administration:

- 1) faites tiédir le flacon au bain-marie (dans un poêlon d'eau tiède);
- 2) dévissez le capuchon qui bouche le compte-gouttes tout en tenant le tube de caoutchouc entre le pouce et l'index;
- 3) retournez le flacon et tenez-le verticalement au-dessus du conduit de l'oreille;
- 4) pressez légèrement le tube de caoutchouc du compte-gouttes entre deux doigts pour que la solution s'écoule goutte à goutte dans le conduit de l'oreille.

#### Si vous avez utilisé plus de Polydexa que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop de Polydexa dans l'oreille, une intoxication n'est pas à craindre.

La présentation de Polydexa sous forme de flacon compte-gouttes limite les risques d'avaler de fortes doses.

Cependant, en cas de prise par la bouche, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

#### Information destinée au médecin traitant:

En cas d'ingestion du contenu d'un flacon, la polymyxine B et la néomycine ne sont pas absorbées mais peuvent donner lieu à des nausées, vomissements et diarrhées.

La dexaméthasone est, quant à elle, résorbée mais peu susceptible de provoquer des effets toxiques à cette dose (un flacon contient 10 mg de metasulfobenzoate sodique de dexaméthasone, ce qui correspond à 6,7 mg de dexaméthasone).

#### Si vous oubliez d'utiliser Polydexa

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée.

Reprenez le traitement dès que possible, sans pour autant modifier les quantités à utiliser ni le nombre d'instillations.

#### Si vous arrêtez d'utiliser Polydexa

Lorsque vous arrêterez le traitement par Polydexa, au moment où votre médecin vous aura dit de le faire, il est possible que la maladie se réactive peu après que vous aurez cessé d'utiliser le médicament. Dans ce cas, consultez à nouveau votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Polydexa peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

#### Système immunitaire:

Polydexa peut éventuellement provoquer une allergie aux aminoglycosides; vous souffrirez alors d'une éruption sur la peau. Il existe aussi la possibilité d'une allergie croisée entre la néomycine, un des composants de Polydexa et les autres antibiotiques du groupe des aminoglycosides. Dans ce cas vous risquez de ne plus pouvoir utiliser les médicaments de ce groupe, même par la bouche ou par la veine.

#### Oreille:

Aussi bien la néomycine que la polymyxine contenues dans Polydexa peuvent être toxiques pour l'oreille interne et l'emploi du médicament en cas de perforation du tympan peut provoquer une surdité ou des troubles de l'équilibre.

#### Oeil :

Vision floue.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou. Site internet : [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be), e-mail : [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER POLYDEXA SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.  
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas utiliser Polydexa après la date de péremption mentionnée sur l'emballage après la mention "EXP. :". La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Que contient Polydexa

- Les substances actives sont :
- la néomycine, présente sous forme de sulfate de néomycine à raison de 0,01 gramme par ml de solution.
- la polymyxine B, présente sous forme de sulfate de polymyxine B à raison de 10.000 unités internationales par ml de solution.
- la dexaméthasone, sous forme de métasulfobenzoate sodique de dexaméthasone, présent à raison de 0,001 gramme par ml de solution.
- Les autres composants sont: le thiomersal, l'acide citrique, une solution d'hydroxyde sodique, le macrogol 400, le polysorbate 80 et l'eau purifiée.

Qu'est-ce que Polydexa et contenu de l'emballage extérieur

Polydexa solution pour instillation auriculaire se présente sous forme d'une solution limpide transparente destinée à être administrée dans l'oreille. Elle est disponible en flacon de 10 ml de solution.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

THERABEL PHARMA S.A.  
Boulevard de l'Humanité 292  
B-1190 Forest

### Fabricant

LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI  
Immeuble le Wilson  
70, avenue Charles de Gaulle  
F - 92800 Puteaux

### Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

BE096537

### Mode de délivrance

Sur prescription.

Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 05/2022.**