

## Sarnacuran 7,5 % Pour-On, 75 mg/ml, solution pour Pour-on

### B. NOTICE

#### NOTICE

Sarnacuran 7,5 % Pour-On, 75 mg/ml, solution pour Pour-on

### Que contient cette notice ?

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT
2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE
3. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS
4. INDICATIONS
5. CONTRE-INDICATIONS
6. EFFETS INDÉSIRABLES
7. ESPÈCES CIBLES
8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION
9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE
10. TEMPS D'ATTENTE
11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)
13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT
14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE
15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### 1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Bayer Animal Health GmbH  
51368 Leverkusen  
Allemagne

Fabricant responsable de la libération des lots:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324  
D-24106 Kiel  
Allemagne

## 2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Sarnacuran Pour-On, 75 mg/ml, solution pour Pour-on  
Foxim

## 3. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS

Phoxim 75 mg/ml - n-Butanol - Isopropanol - Paraffine liquide légère - Bleu patenté V (E131).

## 4. INDICATIONS

Sarnacuran Pour-On est un médicament à usage vétérinaire à base d'un ester organophosphoré (phoxim), destiné à combattre les ectoparasites. Ce médicament est indiqué pour le traitement des porcs infestés par la gale et par les poux. Comme conséquence de l'application du produit sur les porcs, le nombre de mouches dans la porcherie diminue temporairement.

## 5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas traiter d'autres animaux que le porc avec la solution Pour-On.  
Ne pas administrer à des animaux malades ou en convalescence.

## 6. EFFETS INDÉSIRABLES

Lorsque l'on suit les doses préconisées et les précautions recommandées, il ne se produit aucun effet secondaire chez l'utilisateur. Les effets secondaires possibles se ramènent aux symptômes classiques d'une intoxication par ester organo-phosphoré, notamment des maux de tête, nausées, vomissements, lassitude, troubles de la vue, perte de conscience, difficultés respiratoires. Comme il ressort des essais cliniques, les animaux supportent en général très bien le traitement. Chez les porcs traités, on n'enregistre aucune perte de poids, aucune perte d'appétit. On observe rarement une légère irritation de la peau à l'endroit de l'application sur le dos.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

## 7. ESPÈCES CIBLES

Porc.

## 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Sauf avis contraire du vétérinaire, la dose préconisée est de 4 ml de solution par 10 kg de poids corporel.

	Poids corporel	Sarnacuran Pour-On
Porcelets et porcs coureurs	10-20 kg	8 ml
	20-30 kg	12 ml
	30-40 kg	16 ml
	40-50 kg	20 ml
Truies et verrats	par 50 kg	20 ml

Appliquer la solution Pour-On tout le long de l'échine jusqu'à la base de la queue, au moyen d'un pistolet-doseur automatique.

En cas de forte atteinte de la gale, il est conseillé de laisser couler 1 ou 2 ml de la dose préconisée dans chaque conduit externe de l'oreille. Lors d'infestation par poux ou pour traiter une gale légère, il suffit d'appliquer le produit une fois. Dans les cas graves de gale, on doit répéter le traitement après 2 semaines.

Pour prévenir l'apparition de la gale porcine, il faut instaurer un traitement préalable:

\*tous les 6 mois, chez tous les verrats et toutes les truies non porteuses

\*chez toutes les truies porteuses, 1 à 2 semaines **avant** la mise bas

\*chez tous les porcs coureurs **avant** la mise à la porcherie en vue de l'engraissement.

Pour éliminer l'infestation de la gale et prévenir toute réinfestation, traiter tous les animaux. Tous les appareillages et matériaux de l'étable qui sont en contact direct avec les animaux infestés, doivent être traités.

## 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

-

## 10. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats : 17 jours

## 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur le flacon après EXP.

La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 9 mois.

## 12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

### Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Le traitement devra se passer précautionneusement chez les animaux souffrant d'affections cardiaques, de spasmes (des bronches), ou chez des animaux souffrant d'affections hépatiques ou rénales.

### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Éviter le contact direct du produit avec la peau, les yeux et les muqueuses.  
En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.  
En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer à grande eau.  
Porter des gants de protection (gants protectrices jetables en caoutchouc nitrile) et des vêtements de protection (vêtement de dessus à manches longues, pantalon long et bottes) pendant l'application du produit.  
Ôter immédiatement les vêtements accidentellement contaminés.  
Ne pas respirer la fumée. Veiller à une bonne ventilation.  
En cas de symptômes toxiques consulter immédiatement un médecin et montrer la notice, comme avec tous composés organophosphorés.

Tenir à l'écart de la nourriture et des aliments pour animaux.  
Ne pas fumer, ni boire, ni manger pendant l'application du produit.  
Après avoir quitté le local de traitement, laver le plus vite possible les mains, le visage et la peau exposée.  
Laver à fond le pistolet-doseur utilisé.  
Ne pas réutiliser les emballages vides.

### Gestation et lactation

Les truies pleines peuvent être traitées sans inconvénients et aux doses préconisées.

Certains médicaments ne peuvent pas être administrés pendant un traitement au Sarnacuran Pour-On ou pendant une période s'étendant sur 10 jours avant et jusqu'à 10 jours après le traitement.  
Consultez votre vétérinaire à ce propos.  
Ne pas en même temps amener les animaux sous anesthésie générale.

### Interactions médicamenteuses et autres

Ne pas appliquer d'autres médicaments inhibiteurs de la cholinestérase, phénothiazines (p. ex. neuroleptica) ou relâchements musculaires (p. ex. succinylcholine) pendant un traitement au Sarnacuran Pour-On ou pendant une période s'étendant sur 10 jours avant et jusqu'à 10 jours après le traitement.  
Ne pas en même temps amener les animaux sous anesthésie générale.

### Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes)

Les symptômes d'intoxication sont mentionnés sous la rubrique "Effets indésirables".

#### Antidote:

injecter aussi vite que possible du sulfate d'atropine à 1% par voie intramusculaire ou intraveineuse.  
homme: 0,2-0,5 ml.  
animaux: 2,5 ml par 100 kg de poids corporel.  
Répéter l'injection après 15 à 30 minutes, si nécessaire, dépendant de l'amélioration des symptômes.  
Il vaut mieux instaurer également un traitement symptomatique.

## 13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales. Le phoxim est très toxique pour les poissons, les invertébrés aquatiques, les oiseaux et les abeilles. Il peut causer des effets dommageables de longue durée dans l'environnement aquatique.

## 14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Décembre 2020

## 15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Boîte avec 5 flacons de 1000 ml de solution huileuse de 7,5% phoxim (+ appareil doseur et gant).  
Flacons de 1000 ml et 5000 ml de solution huileuse de 7,5% phoxim.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

BE-V146115

### MODE DE DELIVRANCE

A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.