

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

MICROTRAST 70g/100g pasta voor oraal gebruik

Bariumsulfaat, 70 % m/m

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. [WAARVOOR WORDT MICROTRAST GEBRUIKT?](#)
2. [WANNEER MAG U MICROTRAST NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?](#)
3. [HOE GEBRUIKT U MICROTRAST?](#)
4. [MOGELIJKE BIJWERKINGEN](#)
5. [HOE BEWAART U MICROTRAST?](#)
6. [AANVULLENDE INFORMATIE](#)

1. WAARVOOR WORDT MICROTRAST GEBRUIKT?

MICROTRAST is een pasta voor oraal gebruik.

MICROTRAST behoort tot de geneesmiddelen klasse van de röntgencontrastproducten. Het wordt gebruikt voor de onderzoeken waarvoor contrastvulling van de slokdarm is vereist, teneinde organische, functionele en kinetische letsels van de slokdarm of de contouren van het hart in het licht te stellen.

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik.

2. WANNEER MAG U MICROTRAST NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u MICROTRAST niet gebruiken?

- wanneer U allergisch (overgevoelig) bent voor bariumsulfaat of voor één van de andere bestanddelen van MICROTRAST,
- wanneer U lijdt aan gekende of vermoedelijke perforatie of obstructie van het maag-darmkanaal,
- wanneer U lijdt aan overgevoeligheid voor fructose, malabsorptie van glucose of deficiëntie van een sacharase-isomaltase enzym.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met MICROTRAST?

- Men vraagt de patiënt niet op te rispen tijdens het onderzoek.
 - De grenzen die men gewoonlijk toelaat voor de dubbelcontrasttechniek betreffen de moeilijk mobiliseerbare patiënten (hoogbejaarde of zwaarlijvige patiënten).
 - Het is raadzaam het eventueel risico op verhoogde gastro-oesofageale reflux te controleren bij patiënten die dit symptoom vertonen.
 - Voorzichtigheid is geboden als er sprake is van voorafgaande constipatie, colonstenose of atonisch colon, diverticulose, omwille van de mogelijke bariumverharding van de faeces, vooral bij oudere personen.
 - Wanneer U lijdt aan ademhalings- en slikstoornissen.
- Na het onderzoek is het aanbevolen om veel te drinken. Dit om het barium te elimineren en om het risico van verharde faeces en constipatie te voorkomen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

GEBUIKT U NAAST MICROTRAST NOG ANDERE GENEESMIDDELEN, OF HEEFT U DAT KORT GELEDEN GEDAAN? VERTEL DAT DAN UW ARTS OF APOTHEKER. DAT GELDT OOK VOOR GENEESMIDDELEN WAAR U GEEN VOORSCHRIFT VOOR NODIG HEEFT.

Sommige radiologische onderzoeken met contrastmiddelen zijn niet mogelijk gedurende meerdere dagen na toediening van bariumsulfaat. Bariumsulfaat kan de doeltreffendheid van sommige geneesmiddelen, welke tegelijkertijd of kort voordien of nadien langs dezelfde weg werden toegediend, verminderen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap :

MICROTRAST bevat bariumsulfaat, een buitengewoon inert product. Niettemin moet het gevaar van ioniserende straling voor het embryo benadrukt worden. De onschadelijkheid van het gebruik van **MICROTRAST** tijdens de zwangerschap werd niet vastgesteld.

Borstvoeding :

Bariumsulfaat wordt gastro-intestinaal niet geresorbeerd en wordt niet teruggevonden in de moedermelk. Het is dus niet nodig de borstvoeding na een radiologisch onderzoek met **MICROTRAST** te onderbreken.

WILT U ZWANGER WORDEN, BENT U ZWANGER OF GEEFT U BORSTVOEDING? NEEM DAN CONTACT OP MET UW ARTS OF APOTHEKER VOORDAT U GENEESMIDDELEN GEBRUIKT.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

- Dit geneesmiddel bevat 10 mg natrium voor 150 g pasta : hiermee dient rekening gehouden bij personen die een streng zoutarm dieet volgen.
- Dit geneesmiddel bevat 29 mg kalium voor 150 g pasta : hiermee dient rekening gehouden bij personen die een kaliumarm dieet volgen.

3. HOE GEBRUIKT U MICROTRAST?

GEBUIK MICROTRAST ALTIJD PRECIES ZOALS UW ARTS OF APOTHEKER U DAT HEEFT VERTELD. TWIJFELT U OVER HET JUISTE GEBUIK? NEEM DAN CONTACT OP MET UW ARTS OF APOTHEKER.

Volwassenen :

25 tot 40 g pasta inslikken zonder kauwen (om luchtballen te vermijden).

Kinderen :

Onderzoeken bij kinderen zijn zeldzaam. Er wordt geen dosis aanbevolen, dit wordt overgelaten aan het oordeel van de radioloog.

Heeft u te veel van MICROTRAST gebruikt?

Wanneer u te veel **MICROTRAST** heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd.

Bent u vergeten MICROTRAST te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van MICROTRAST

Niet van toepassing

HEEFT U NOG ANDERE VRAGEN OVER HET GEBUIK VAN DIT GENEESMIDDEL? NEEM DAN CONTACT OP MET UW ARTS OF APOTHEKER.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan **MICROTRAST** bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Werden zelden gemeld (tussen 1 geval op 1.000 en 1 geval op 10.000) : misselijkheid

Werden zeer zelden gemeld (minder dan 1 geval op 10.000) :

- Gevallen van allergische reactie (jeuk, netelroos, anafylactische shock, algemene rash).
- Constipatie, diarree en abdominale pijn onder vorm van krampen.
- Uitzonderlijke gevallen van appendicitis, verharding van de faeces en darmocclusie.
- Bij darmperforatie kan het uitreden van bariumsulfaat in de buikholte ernstige gevolgen hebben die een operatieve ingreep binnen de 6 uur noodzakelijk maken.
- Enkele gevallen van pneumopathie na toevallige inademing of tijdens het braken.
- Bij overgang van een kleine hoeveelheid bariumsulfaat in het bloed, kan een cardiopulmonale bariumembolie voorkomen.
- Wegens de aanwezigheid van glycerol, kunnen spijsverteringsstoornissen zoals diarree zich voordoen.

KRIJGT U VEEL LAST VAN EEN BIJWERKING? OF HEEFT U EEN BIJWERKING DIE NIET IN DEZE BIJSLUITER STAAT? NEEM DAN CONTACT OP MET UW ARTS OF APOTHEKER.

5. HOE BEWAART U MICROTRAST?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Geen speciale bewaarinstructies.

Gebruik **MICROTRAST** niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en op de verpakking van de flacon na de vermelding "**EXP**". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in MICROTRAST?

- De werkzame stof is : bariumsulfaat
- De andere stoffen zijn : P. natrium methyl-hydroxybenzoaat, P. natrium propyl-hydroxybenzoaat, kaliumsorbaat, natriumsacharine, karamel-vanille aroma, glycerol, zwavelzuur, xanthaangom, gezuiverd water

Hoe ziet MICROTRAST eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

MICROTRAST is een pasta voor oraal gebruik, verpakt in tubes van 150 g of 800 g.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Guerbet, B.P. 57400 – 95943 Roissy CdG Cedex, France

Registratienummer : BE 039566

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in : 02/2011