Chloraseptine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

CHLORASEPTINE 250mg Tabletten

Chlooramine T 250mg

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na sommige dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. WAARVOOR WORDT CHLORASEPTINE 250MG GEBRUIKT ?
2. WANNEER MAG U CHLORASEPTINE 250MG NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
3. HOE GEBRUIKT U CHLORASEPTINE 250MG?
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
5. HOE BEWAART U CHLORASEPTINE 250MG ?
6. AANVULLENDE INFORMATIE

1. WAARVOOR WORDT CHLORASEPTINE 250mg GEBRUIKT ?

Farmacotherapeutische groep : antiseptisch en ontsmettend.

Therapeutische indicaties :
Na verdunning in water:
- Universeel ontsmettingsmiddel van wonden.
- Ontsmetting van oppervlakken (lokalen, gootstenen, koelkasten, …).
- Algemene chirurgie, urologie (blaasinstillatie), gynaecologie (antiseptische vaginale irrigatie).
- Verkrijgen van drinkwater.

2. WANNEER MAG U CHLORASEPTINE 250mg NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u Chloraseptine 250mg niet gebruiken?

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor chlooramine T (Tosylchloramide natrium).
- Geen contact met de ogen en de slijmvliezen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Chloraseptine 250mg?

Oplossingen niet langer dan 24 uur bewaren.
Niet inslikken noch frequent inademen om irritatie van de luchtwegen te voorkomen.
De aangewezen dosis voor de gekozen toepassing niet overschrijden.
Onverenigbaar met alcohol, zuurstofwater en alkalische zepen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Chloraseptine 250mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Chlooramine T is meest aktief bij een pH van 5 tot 7. Men zal er dus op letten geen alkalische zepen te gebruiken bij het wassen van de huid of deze goed met water afspoelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

De ontsmettende oplossingen van Chloraseptine 250mg mogen gebruikt worden tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.
Respecteer voornamelijk de speciale voorzorgsmaatregelen wat betreft orale inname en inademing.
Bij borstvoeding zal het product niet op de borsten aangebracht worden om de inname door de zuigeling te vermijden.

3. HOE GEBRUIKT U CHLORASEPTINE 250mg?

Gebruik Chloraseptine 250mg altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wijze van toediening: tabletten voor “uitwendig gebruik” die opgelost dienen te worden door ze te verbrijzelen in lauw water.

Tabletten verbrijzelen om de oplossing te vergemakkelijken.
De tabletten in fijne stukjes verbrijzelen in water met een temperatuur van maximum 25-30°C om decompositie van het product (bij 37°C) te vermijden.

De tabletten oplossen in lauw water:
- Irrigatie van de wonden of aanbrengen met behulp van kompressen: 10 tot 20 tabletten in 1 liter water, 1 tot 2 tabletten in 100 ml water (of een halve tas).
- Gynaecologie, urologie: 1 tot 2 tabletten in 1 liter lauw water.
- Algemene ontsmetting van oppervlakken: 8 tabletten per liter.
- Drinkwater: 1 tot 2 tabletten per 20 liter koud water (of 12,5 tot 25 mg/l).
Wacht één uur alvorens het water te drinken.

Heeft u te veel van Chloraseptine 250mg gebruikt ?

Wanneer u teveel van Chloraseptine 250mg heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Orale inname van Chloraseptine 250mg veroorzaakt binnen enkele minuten braken, blauw kleuring van de huid en ademstilstand.
De behandeling zal bestaan uit het geven van melk, het toedienen van medicinale kool, gevolgd door het uitvoeren van een maagspoeling en het geven van een braakmiddel.

Als u stopt met het gebruik van Chloraseptine 250mg

Indien de behandeling met Chloraseptine 250mg te vroeg wordt gestopt kan de infectie heroptreden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Chloraseptine 250mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als het product onverdund wordt aangebracht op de ogen kan dit leiden tot ernstige conjunctivitis.

Lokale irritatie van de huid of slijmvliezen op de plaats waar de oplossing wordt aangebracht zou kunnen voorkomen doch is zeldzaam.
Irritatie van de luchtwegen bij inademen van de dampen is mogelijk.
Er werd een geval van allergie met netelroos, kortademigheid en oedeem vastgesteld.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CHLORASEPTINE 250mg ?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Chloraseptine 250mg niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Chloraseptine 250mg ?

- Het werkzaam bestanddeel is chlooramine 250 mg (Tosylchloramide natrium)
- Het ander bestanddeel is natriumbicarbonaat.

Hoe ziet Chloraseptine 250mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?

Tabletten voor “uitwendig gebruik” voor het bereiden van antiseptische of ontsmettende oplossingen.

60 tabletten in een glazen fles voorzien van een etiket of in een bedrukte plastieken doosje.
500 tot 1000 tabletten in een ziekenhuisverpakking.

Vrije aflevering

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen : BE024062

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
LABORATORIA STEROP - Scheutlaan 46-50 – B-1070 Brussel - Belgium

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 08/2011