

**Bijsluiter: Informatie voor de patiënt**  
**Ferricure 150 mg, harde capsules**  
Ferri polysacharaat complex.

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## Inhoud van deze bijsluiter

1. [WAT IS FERRICURE EN WAARVOOR WORDT FERRICURE GEBRUIKT?](#)
2. [WANNEER MAG U FERRICURE NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?](#)
3. [HOE GEBRUIKT U FERRICURE CAPSULES?](#)
4. [MOGELIJKE BIJWERKINGEN](#)
5. [HOE BEWAART U FERRICURE CAPSULES?](#)
6. [INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE](#)

### 1. WAT IS FERRICURE EN WAARVOOR WORDT FERRICURE GEBRUIKT?

Geneesmiddel tegen bloedarmoede. Bevat ijzerpolysacharaat complex. Ferricure is aangewezen **bij de preventie en de behandeling van bloedarmoede veroorzaakt door ijzertekort.**

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

## 2. WANNEER MAG U FERRICURE NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

### Wanneer mag u Ferricure niet gebruiken?

- U bent **allergisch voor ferri polysacharaat complex** of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U bent **allergisch voor tarwe**, te wijten aan de **aanwezigheid van tarwetzetmeel**.
- U lijdt aan **een aandoening waarbij een verhoogde hoeveelheid ijzer in het bloed voorkomt** (hemochromatose, hypersiderose).
- U heeft een andere vorm van bloedarmoede dan ferriprive anemie.

### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ferricure?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Ferricure inneemt.

- Als u **andere geneesmiddelen op basis van ijzer inneemt**.
- Als u **bepaalde laboratoriumonderzoeken dient te ondergaan**. Dit geneesmiddel kan bepaalde onderzoeken (benzidinetests) vertekenen.
- Een correcte hygiëne kan tandverkleuring voorkomen of verhelpen.

### Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

FERRICURE capsules is niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar.

### Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

- **Antiacida** (geneesmiddelen voor het maagdarm-kanaal) **verminderen de opname van ijzer**.
- Er bestaat een **wederzijdse interferentie wat betreft resorptie tussen tetracyclines (antibacterieel geneesmiddel), cholestyramine (hypolipemierend geneesmiddel), ciprofloxacine (antibacterieel geneesmiddel), levofloxacine (antibacterieel geneesmiddel), norfloxacine (antibacterieel geneesmiddel), ofloxacine (antibacterieel geneesmiddel), temafloxacine (antibacterieel geneesmiddel), penicillamine (antibacterieel geneesmiddel)** aan de ene kant, en **ijzerzouten** (aangewezen bij de preventie en de behandeling van ferriprive anemie), aan de andere kant.

- **Ijzerzouten** (aangewezen bij de preventie en de behandeling van bloedarmoede veroorzaakt door ijzertekort) **verminderen de resorptie van methyldopa** (geneesmiddel tegen hypertensie).

Neemt u naast Ferricure nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

### Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem de capsules een half uur voor de maaltijd of buiten de maaltijd in, om de opname van ijzer niet te verminderen.

### Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

De dagelijkse ijzerbehoefte van de zwangere vrouw of de vrouw die borstvoeding geeft, wordt amper gedekt door voedselinname alleen. De inname van Ferricure vult deze aan.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

### Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ferricure heeft geen enkele invloed op de rijvaardigheid en het besturen van machines.

### Ferricure capsules bevatten tarwetzetmeel.

Geschikt voor mensen met coeliakie. Patiënten met een allergie (overgevoeligheid) voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

## 3. HOE GEBRUIKT U FERRICURE CAPSULES?

Gebruik Ferricure capsules altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### De aanbevolen dosering is:

**Voor volwassenen**, 1 capsule per dag met een glas water, ½ uur voor de maaltijd of buiten de maaltijd. Indien nodig kan het doseringsschema voor Ferricure worden verhoogd tot maximum 2 capsules per dag, verdeeld over 2 innames.

**Voor zwangere vrouwen** wordt algemeen aangenomen dat dosissen van 40 mg tot 100 mg per dag in 80% tot 90% van de gevallen volstaan ter voorkoming van ijzertekort.

**Voor vrouwen die borstvoeding geven**, bedraagt de aanbevolen dagelijkse dosis 10 mg ijzer.

**Ferricure bestaat ook onder vorm van drank, deze presentatie zorgt voor een betere dosering voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.**

### Gebruik bij kinderen, zwangere en zogende vrouwen

Ferricure capsules is niet aanbevolen bij kinderen onder 12 jaar.

Ferricure bestaat ook onder vorm van drank, deze presentatie zorgt voor een betere dosering voor kinderen.

### Duur van de behandeling

Uw arts deelt u mee hoelang u Ferricure dient in te nemen. De behandeling kan meerdere maanden duren. Respecteer de voorgeschreven dosis en de behandelingsduur die door uw arts werden voorgeschreven.

### Heeft u te veel Ferricure ingenomen?

Indien de capsules, per ongeluk en in zeer grote hoeveelheden werden ingenomen kunnen volgende verschijnselen optreden: **nausea (misselijkheid), braken, buikpijn, diarree. Kinderen zijn gevoeliger voor grotere dosissen**. Indien u te veel Ferricure innam, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245). **Stop dan onmiddellijk de inname en neem deferoxamine in**, het specifieke tegengif voor ijzer, en/of raadpleeg uw arts of apotheker.

### Bent u vergeten Ferricure in te nemen?

Neem geen dubbele dosis in om de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg uw arts. Hij zal u de nodige instructies geven.

### Als u stopt met het innemen van Ferricure

Respecteer de voorgeschreven dosis en de behandelingsduur die door uw arts werden voorgeschreven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van Ferricure? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook Ferricure bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

**Vaak voorkomende bijwerkingen zijn gastro-intestinale klachten** zoals nausea (1,75%), braken (3,4%), diarree (1,46%), buikpijn (1,46%).  
**De stoelgang kan een zwarte kleur vertonen.** Deze kleuring is normaal en betekent geen gevaar.

### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

#### België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten  
Afdeling Vigilantie

Galileelaan 5/03 1210 BRUSSEL	Postbus 97 1000 BRUSSEL Madou
----------------------------------	-------------------------------------

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)  
e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)

#### Luxemburg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy

[crpv@chru-nancy.fr](mailto:crpv@chru-nancy.fr)

Tél. : (+33) 3 83 65 60 85 / 87

Fax : (+33) 3 83 65 61 33

Of

Division de la Pharmacie et des Médicaments, Direction de la santé à Luxembourg

[pharmacovigilance@ms.etat.lu](mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu)

Tél. : (+352) 247-85592

Fax : (+352) 247-95615

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## 5. HOE BEWAART U FERRICURE CAPSULES?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. **Bewaren beneden 30°C**, in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Gebruik Ferricure niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

### Welke stoffen zitten er in Ferricure capsules?

De werkzame stof in Ferricure is 326,10 mg Ferri polysacharaat complex (equivalent aan 150 mg Fe). De andere stoffen zijn tarwezetmeel, gelatine, magnesiumstearaat, rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171).

### Hoe ziet Ferricure, capsules eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ferricure, capsules is verkrijgbaar in dozen van 28 en 56 roodgekleurde capsules (blisterverpakkingen van 14 capsules). Ferricure is ook verkrijgbaar als drank.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

N.V. Farmaceutische Laboratoria Trenker

Avenue Thomas Edisonlaan 32•

BE-1402 Thines-België.

T +32 (0)2 374 02 53

F +32 (0)2 374 68 81

E Mail info@trenker.be

### Afleveringswijze

**Geneesmiddel op medisch voorschrift**

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE102313**

*Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2021.*