Ferricure

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt
Ferricure 150 mg, harde capsules
Ferri polysacharaat complex.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
• Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. WAT IS FERRICURE EN WAARVOOR WORDT FERRICURE GEBRUIKT?
2. WANNEER MAG U FERRICURE NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
3. HOE GEBRUIKT U FERRICURE CAPSULES?
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
5. HOE BEWAART U FERRICURE CAPSULES?
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

1. WAT IS FERRICURE EN WAARVOOR WORDT FERRICURE GEBRUIKT?

Geneesmiddel tegen bloedarmoede (anemie). Bevat ijzerpolysacharaat complex. Ferricure is aangewezen **bij de preventie en de behandeling van bloedarmoede veroorzaakt door ijzertekort** bij kinderen vanaf 12 jaar, adolescenten en volwassenen.

2. WANNEER MAG U FERRICURE NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Ferricure niet gebruiken?
- Als u **allergisch bent voor ferri polysacharaat complex** of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u **allergisch bent voor tarwe**, te wijten aan de **aanwezigheid van tarwezetmeel.**
- Als u **darmdivertikels of een andere darmobstructie** heeft.
- Als u een **ziekte heeft die een ijzerstapeling veroorzaakt** (hemochromatose, hypersiderose).
- Als u **meerdere bloedtransfusies** heeft gekregen.
- Als u **een andere vorm heeft van bloedarmoede dan bloedarmoede als gevolg van ijzertekort.**

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ferricure?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Ferricure inneemt.
- Als u **andere geneesmiddelen op basis van ijzer inneemt.**

- Als u (of uw kind) Ferricure gebruikt voor **bloedarmoede als gevolg van ijzertekort**, moet ook de oorzaak van dit ijzertekort worden opgespoord en behandeld.

- Als u **bepaalde laboratoriumonderzoeken dient te ondergaan**. Dit geneesmiddel kan bepaalde onderzoeken (benzidinetests) vertekenen.
- Een correcte hygiëne kan tandverkleuring voorkomen of verhelpen.

- Op basis van gepubliceerde gegevens in de literatuur zijn verkleuringen van de wand van het maag-darmkanaal waargenomen bij oudere patiënten die lijden aan nierinsufficiëntie, diabetes (abnormaal hoge bloedsuikerspiegel) en/of een verhoogde bloeddruk (hypertensie) en die geneesmiddelen voor deze aandoeningen samen met een ijzersuppletie kregen om hun bloedarmoede te behandelen. Deze verkleuring van de maag-darmwand kan de maag-darmchirurgie bemoeilijken. Gezien dit risico, als een chirurgische ingreep is gepland, wordt aanbevolen de chirurg te informeren over de noodzaak van een continue ijzersuppletie voort te zetten (zie rubriek 4).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
FERRICURE capsules is niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, heeft gebruikt of overweegt te gebruiken.

Sommige geneesmiddelen mogen niet tegelijkertijd worden gebruikt, terwijl andere geneesmiddelen specifieke aanpassingen vereisen (bijvoorbeeld in het tijdstip van inname) :

- Als u (of uw kind) injecteerbare geneesmiddelen met ijzer gebruikt, moet u het innemen van Ferricure vermijden.

Als u (of uw kind) de volgende geneesmiddelen gebruikt, moet u de toediening ervan met Ferricure met minimaal 2 uur spreiden :

- antibiotica (tetracyclinen, fluoroquinolonen),
- geneesmiddelen voor de behandeling van chronische urineweginfecties (acetohydroxaamzuur),
- geneesmiddelen voor de behandeling van HIV-infectie (integraseremmers, bictegravir),
- geneesmiddelen voor de behandeling van botontkalking (bisfosfonaten),
- geneesmiddelen voor de behandeling van gewrichtsaandoeningen, de ziekte van Wilson of ter preventie van nierstenen (penicillamine, triëntine),
- geneesmiddelen tegen een teveel aan maagzuur : gastro-intestinale mineralenpreparaten, kool of antacida (aluminium-, calcium- en magnesiumzouten),
- geneesmiddelen voor de behandeling van een schildklieraandoening (levothyroxine, liothyronine),
- geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (methyldopa, levodopa, carbidopa, entacapon),
- supplement en/of geneesmiddel dat zink, calcium of strontium bevat.

Als u (of uw kind) colestyramine gebruikt, moet Ferricure 1 tot 2 uur voor of 4 tot 6 uur na colestyramine worden toegediend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Calciumrijke voeding kan de opname van ijzer in het spijsverteringskanaal verminderen en daarmee de werkzaamheid van de behandeling doen afnemen. Neem dit product daarom buiten de maaltijden en niet samen met zuivelproducten.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, als u denkt zwanger te zijn of van plan bent zwanger te worden, vraag dan uw arts of apotheker om advies voor u dit geneesmiddel inneemt.

De dagelijkse ijzerbehoefte van de zwangere vrouw of de vrouw die borstvoeding geeft, wordt amper gedekt door voedselinname alleen. De inname van Ferricure vult deze aan.

Er zijn weinig gegevens over ijzersuppletie tijdens het eerste trimester van de zwangerschap, maar er zijn veel bibliografische gegevens beschikbaar bij zwangere vrouwen in het tweede en derde trimester van de zwangerschap. Deze gegevens wijzen niet op toxiciteit voor de foetus en/of de pasgeborene.
Daarom kan Ferricure tijdens de zwangerschap worden gebruikt wanneer dit klinisch noodzakelijk is.
Dit geneesmiddel kan tijdens het geven van borstvoeding worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat het gebruik van Ferricure invloed heeft op het rijvermogen en het vermogen om machines te bedienen.

Ferricure capsules bevatten tarwezetmeel (zachte tarwe)
Dit geneesmiddel bevat een zeer lage hoeveelheid gluten (afkomstig van tarwezetmeel). Het wordt beschouwd als "glutenvrij" en zal daarom waarschijnlijk geen problemen veroorzaken bij coeliakie. Een capsule bevat niet meer dan 11,3 microgram gluten. Als u een tarweallergie heeft (anders dan coeliakie), mag u dit geneesmiddel niet innemen.

3. HOE GEBRUIKT U FERRICURE CAPSULES?

Gebruik Ferricure capsules altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is:
Voor volwassenen, 1 capsule per dag met een glas water, ½ uur voor de maaltijd of buiten de maaltijd. Indien nodig kan het doseringsschema voor Ferricure worden verhoogd tot maximum 2 capsules per dag, verdeeld over 2 innames.
Voor zwangere vrouwen wordt algemeen aangenomen dat dosissen van 40 mg tot 100 mg per dag in 80% tot 90% van de gevallen volstaan ter voorkoming van ijzertekort.
Voor vrouwen die borstvoeding geven, bedraagt de aanbevolen dagelijkse dosis 10 mg ijzer.
Ferricure bestaat ook onder vorm van drank, deze presentatie zorgt voor een betere dosering voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Gebruik bij kinderen
Ferricure capsules is niet aanbevolen bij kinderen onder 12 jaar.
Ferricure bestaat ook onder vorm van drank, deze presentatie zorgt voor een betere dosering voor kinderen.

Duur van de behandeling
Uw arts deelt u mee hoelang u Ferricure dient in te nemen. De behandeling kan meerdere maanden duren. Respecteer de voorgeschreven dosis en de behandelingsduur die door uw arts werden voorgeschreven.

Heeft u te veel Ferricure ingenomen?
Indien de capsules, per ongeluk en in zeer grote hoeveelheden werden ingenomen kunnen volgende verschijnselen optreden: **nausea (misselijkheid), braken, buikpijn, diarree. Kinderen zijn gevoeliger voor grotere dosissen.** Indien u te veel Ferricure innam, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245). **Stop dan onmiddellijk de inname en neem deferoxamine in**, het specifieke tegengif voor ijzer, en/of raadpleeg uw arts of apotheker.

Bent u vergeten Ferricure in te nemen?
Neem geen dubbele dosis in om de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg uw arts. Hij zal u de nodige instructies geven.

Als u stopt met het innemen van Ferricure
Respecteer de voorgeschreven dosis en de behandelingsduur die door uw arts werden voorgeschreven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van Ferricure? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, maar niet bij iedereen.
.

U (of uw kind) kunt de volgende bijwerkingen ondervinden, gerangschikt van meest naar minst frequent :
Vaak voorkomend (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen) :

- constipatie
- diarree
- buikopzetting
- buikpijn
- abnormale verkleuring van de ontlasting
- misselijkheid

Soms voorkomend (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen) :

- zwelling van de keel (larynxoedeem)
- abnormale ontlasting
- indigestie (dyspepsie)
- braken
- ontsteking van de maagwand (gastritis)
- jeuk (pruritus)
- rode huiduitslag (erythemateuze rash)

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) :

- allergische reactie (overgevoeligheidsreactie)
- huiduitslag met jeuk (urticaria)
- verkleuring van de tanden
- verkleuring van de wand van het maag-darmkanaal (gastro-intestinale melanose) (zie rubriek 2).

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan de autoriteiten:

België
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
www.fagg.be
Afdeling Vigilantie:
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy of Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé
website : www.guichet.lu/pharmacovigilance

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U FERRICURE CAPSULES?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. **Bewaren beneden 30°C**, in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Gebruik Ferricure niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Ferricure capsules?

- De werkzame stof in Ferricure is 326,10 mg Ferri polysacharaat complex (equivalent aan 150 mg Fe).
- De andere stoffen zijn tarwezetmeel, gelatine, magnesiumstearaat, rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171).

Hoe ziet Ferricure, capsules eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ferricure, capsules is verkrijgbaar in dozen van 14, 28 en 56 roodgekleurde capsules (blisterverpakkingen van 14 capsules). Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.

Ferricure is ook verkrijgbaar als drank.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
N.V. Farmaceutische Laboratoria Trenker
Avenue Thomas Edison 32
BE-1402 Thines-België.
T +32 (0)2 374 02 53
E Mail info@trenker.be

Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE102313

*Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in **oktober 2025**.*

De datum waarop deze bijsluiter voor het laatst is goedgekeurd is 03/2026