BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

CERULYX 4,55% oordruppels, oplossing

Xylol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Cerulyx wordt gebruikt om proppen van oorsmeer in de oren op te lossen.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- als het trommelvlies doorboord is door een infectie of als gevolg van een verwonding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, zodat hij kan nagaan of het trommelvlies ongeschonden is. Want als het trommelvlies doorboord is, kan de toediening van dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken ter hoogte van het middenoor (dat zich bevindt tussen het inwendig en het uitwendig oor).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Er zijn geen gegevens bekend.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Cerulyx nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Er zijn geen contra-indicaties bekend.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Cerulyx heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

- **Als u zachte oorsmeerproppen in het oor heeft:** laat enkele druppels in het oor vallen terwijl u het hoofd enkele minuten naar de andere zijde gebogen houdt. Daarna het oor spoelen.
- **Als u harde oorsmeerproppen of proppen van huidschilfers in het oor heeft:** leeg de druppelteller in het oor terwijl u het hoofd naar de andere zijde gebogen houdt. Doe dit 3 maal per dag gedurende de 3 à 4 dagen net vóór de verwijdering van de oorsmeerprop.
- **Als u Cerulyx gebruikt om het oor te reinigen:** laat enkele druppels in het oor vallen terwijl u het hoofd naar de andere zijde gebogen houdt. Doe dit 3 maal per dag gedurende de 4 tot 6 dagen net vóór de reiniging door een specialist.

Hoe gebruikt u het flesje?
Bij het gebruik van deze oplossing, moet u de volgende stappen respecteren:

1- Warm het flesje op door het enkele minuten in uw handpalmen te houden, en zo het onaangename contact van de koude druppels met het oor te vermijden.



2- Schroef de druppelteller waarmee de dop wordt afgesloten, volledig los.



3- Verwijder de afdichting aan de binnenkant van de dop door de druppelteller stevig in te drukken.



4- Schroef de druppelteller weer op het flesje.

5- Schroef vervolgens de gekleurde dop van de druppelteller los en plaats die terug na gebruik.

6- Houd het flesje recht na eerste opening.

Behandelingsduur: uw arts zal u zeggen hoelang u Cerulyx moet gebruiken.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u meer van Cerulyx heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070 245 245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Druppel de dosis in die u had moeten gebruiken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- reacties van irritatie
- overgevoeligheid ter hoogte van het oor

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de website:
België: www.fagg.be,
Luxemburg: www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament,
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Na eerste opening van het flesje moet het product binnen de 30 dagen gebruikt worden. Het flesje gedurende deze 30 dagen verticaal houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is xylol: een mengsel van xyleenisomeren 455 mg/10 ml.
- De andere stoffen in dit middel zijn alfatocoferolacetaat, lavendelolie en amandelolie.

Hoe ziet Cerulyx eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Cerulyx is oplossing voor toediening in het oor.
Flacon van 10 ml in bruingekleurd glas met druppelteller in PVC polypropyleen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Bausch & Lomb Pharma nv – Lambermontlaan 430 – 1030 Brussel

Fabrikant
Laboratoire CHAUVIN – ZI Ripotier Haut – 07200 Aubenas - Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 016256

Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 11/2015.