

**BIJSLUITER**

**Bijsluiter: informatie voor de patiënt**

**Tezspire 210 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde pen**  
tezepelumab

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

## Inhoud van deze bijsluiter

1. [WAT IS TEZSPIRE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?](#)
2. [WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?](#)
3. [HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?](#)
4. [MOGELIJKE BIJWERKINGEN](#)
5. [HOE BEWAART U DIT MIDDEL?](#)
6. [INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE](#)

## 1. WAT IS TEZSPIRE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

### Wat is Tezspire en hoe werkt het?

Tezspire bevat de werkzame stof tezepelumab, een monoklonaal antilichaam. Antilichamen zijn eiwitten die een bepaalde doelwitstof in het lichaam herkennen en eraan binden. Voor tezepelumab is dit doelwit een eiwit dat we *thymisch stromaal lymfopoëetine* (TSLP) noemen. TSLP speelt een belangrijke rol bij het veroorzaken van een ontsteking in uw luchtwegen. Door deze ontsteking ontstaan de verschijnselen en klachten van astma en chronische neusbijholteontsteking (rinosinusitis) met neuspoliepen (CRSwNP). Door de werking van TSLP tegen te gaan, helpt dit geneesmiddel de ontsteking en klachten van astma en CRSwNP te verminderen.

### Waarvoor wordt Tezspire gebruikt?

#### Astma

Tezspire wordt samen met andere astmamedicijnen gebruikt voor de behandeling van ernstig astma bij volwassenen en jongeren (12 jaar en ouder) als de ziekte niet onder controle kan worden gebracht met de astmamedicatie die zij nu gebruiken.

#### Chronische neusbijholteontsteking (rinosinusitis) met neuspoliepen (CRSwNP)

Tezspire wordt ook samen met andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van CRSwNP bij volwassenen.

### Hoe kan Tezspire helpen?

#### Astma

Tezspire kan het aantal astma-aanvallen dat u heeft verminderen, uw ademhaling verbeteren en uw astmaklachten verminderen.

#### CRSwNP

Tezspire kan uw poliepen kleiner maken, en vermindert verschijnselen zoals een verstopte neus en reukverlies. Tezspire kan er ook voor zorgen dat u minder orale corticosteroiden en minder operaties nodig heeft.

## 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

### Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- **U bent allergisch** voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Als dit voor u geldt, of als u het niet zeker weet, **neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige**.

### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

- Tezspire is **geen noodmedicijn**. Gebruik het niet om een plotselinge astma-aanval te behandelen.
- **Als uw astma helemaal niet verbetert of erger wordt** tijdens de behandeling met dit geneesmiddel, **neem dan contact op met een arts of verpleegkundige**.
- **Let op tekenen van allergische reacties**. Geneesmiddelen zoals Tezspire zouden bij sommige mensen ernstige allergische reacties kunnen veroorzaken. De tekenen van deze reacties kunnen verschillend zijn, maar kunnen zwelling van uw gezicht, tong of mond, ademhalingsproblemen, een snelle hartslag, flauwvallen, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, netelroos en huiduitslag zijn. Als u een of meer van deze tekenen heeft, **neem dan meteen contact op met een arts of verpleegkundige**.

Praat met uw arts over hoe u vroege tekenen van allergie kunt herkennen en hoe u omgaat met reacties als deze optreden.

- **Let op tekenen van een mogelijke ernstige infectie** terwijl u Tezspire gebruikt, zoals:
  - koorts, griepachtige klachten, nachtelijk zweten;
  - hoest die niet weggaat;
  - warme, rode en pijnlijke huid, of een pijnlijke huiduitslag met blaren.

Als u een van deze klachten opmerkt, **neem dan meteen contact op met een arts of verpleegkundige**.

**Als u al een ernstige infectie heeft, neem dan contact op met uw arts** voordat u Tezspire gebruikt.

- **Let op eventuele klachten van een hartaandoening**, zoals:
  - pijn op de borst;
  - kortademigheid;
  - een algemeen gevoel van ongemak, ziekte of gebrek aan welzijn;
  - licht gevoel in het hoofd of flauwvallen.

Als u een van deze klachten opmerkt, **neem dan meteen contact op met een arts of verpleegkundige.**

- **Als u een parasitaire (worm)infectie heeft** of als u woont in (of reist naar) een gebied waar parasitaire infecties vaak voorkomen, **neem dan contact op met uw arts.** Tezspire kan ervoor zorgen dat uw lichaam bepaalde soorten parasitaire infecties minder goed kan bestrijden.

#### **Elke keer als u een nieuwe verpakking Tezspire krijgt**

- Schrijf de naam en het lotnummer op. Het lotnummer staat op de doos en op het etiket van de voorgevulde pen. Bewaar deze informatie op een plek waar u deze goed kunt terugvinden. Er kan later naar deze informatie worden gevraagd.

#### **Kinderen**

##### **Astma**

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 12 jaar voor de behandeling van astma. De veiligheid en voordelen van dit geneesmiddel bij kinderen van deze leeftijd zijn niet bekend.

##### **CRSwNP**

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 18 jaar voor de behandeling van CRSwNP. De veiligheid en voordelen van dit geneesmiddel bij kinderen van deze leeftijd zijn niet bekend.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen tegen astma?**

- **Stop niet opeens met het gebruik** van uw andere astmamedicijnen als u met Tezspire begint. Dit is vooral belangrijk als u steroïden gebruikt (ook wel corticosteroïden genoemd). Deze geneesmiddelen moeten stap voor stap worden stopgezet, onder begeleiding van uw arts en op basis van uw reactie op Tezspire.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Vertel het uw arts of apotheker als:

- u naast Tezspire nog andere geneesmiddelen gebruikt, dat kort geleden heeft gedaan of als de mogelijkheid bestaat dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken.
- u kort geleden een vaccinatie heeft gehad of binnenkort een vaccinatie krijgt.

#### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

- Gebruik Tezspire niet tijdens de zwangerschap, behalve als uw arts dit adviseert. Het is niet bekend of Tezspire kwaad kan voor uw ongeboren baby.
- Tezspire kan in de moedermelk komen. Als u borstvoeding geeft of borstvoeding wilt gaan geven, neem dan contact op met uw arts.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Het is onwaarschijnlijk dat dit middel invloed heeft op uw rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

#### **Tezspire bevat natrium**

In dit geneesmiddel zit minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 210 mg. Dat betekent dat het zo goed als 'natriumvrij' is.

#### **Tezspire bevat L-proline**

Dit geneesmiddel bevat 48 mg L-proline per dosis van 210 mg, dit komt overeen met 25 mg/ml. L-proline kan schadelijk zijn voor patiënten met hyperprolinemie. Dit is een zeldzame erfelijke ziekte waarbij L-proline zich ophoopt omdat het lichaam dit niet goed kan omzetten. Heeft u of uw kind hyperprolinemie? Vertel dit aan uw arts. Gebruik dit middel niet als u of uw kind hyperprolinemie heeft, tenzij uw arts dit middel heeft voorgeschreven.

#### **Tezspire bevat polysorbaat**

Dit geneesmiddel bevat 0,19 mg polysorbaat 80 in elke dosis van 210 mg. Dit komt overeen met 0,1 mg/ml. Polysorbaten kunnen allergische reacties veroorzaken. Heeft u of uw kind bekende allergieën? Vertel dit aan uw arts.

### 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Tezspire wordt gegeven als een injectie onder de huid (subcutaan).

Astma

#### Gebruik bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder

- De **aanbevolen dosering** is 210 mg (1 injectie) elke 4 weken.

CRSwNP

#### Gebruik bij volwassenen van 18 jaar en ouder

- De **aanbevolen dosering** is 210 mg (1 injectie) elke 4 weken.

Uw arts of verpleegkundige zal beslissen of u zichzelf kunt injecteren of dat uw verzorger dat voor u kan doen. Als dat zo is, moet u of uw verzorger worden getraind om Tezspire op de juiste manier klaar te maken en te injecteren.

Voordat u zelf Tezspire injecteert, moet u de gebruiksaanwijzing voor de Tezspire voorgevulde pen goed lezen. Doe dit elke keer als u een nieuwe injectie krijgt. Er kan nieuwe informatie in staan.

Deel de Tezspire voorgevulde pen niet met anderen. Gebruik de Tezspire voorgevulde pen niet meer dan één keer.

#### Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

- Als u vergeten bent een dosis te injecteren, injecteer dan zo snel mogelijk alsnog een dosis. Neem daarna uw volgende injectie op de eerstvolgende geplande injectiedag.
- Als u niet merkt dat u een dosis heeft overgeslagen totdat het tijd is voor uw volgende dosis, injecteer dan gewoon de volgende dosis zoals gepland. **Injecteer geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.**
- Als u niet zeker weet wanneer u Tezspire moet injecteren, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

#### Als u stopt met het gebruik van dit middel

- Stop niet met het gebruik van Tezspire zonder eerst met uw arts, apotheker of verpleegkundige te overleggen. Als u de behandeling met Tezspire onderbreekt of helemaal stopt, kunnen uw klachten of aanvallen terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

## 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

### Ernstige allergische reacties

**Zoek onmiddellijk medische hulp** als u denkt dat u een allergische reactie heeft. Een allergische reactie kan binnen enkele uren of dagen na de injectie voorkomen.

**Niet bekend** (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

- Allergische reacties, waaronder ernstige allergische reactie (anafylaxie)

Klachten zijn meestal:

- zwelling van uw gezicht, tong of mond
- ademhalingsproblemen, een snelle hartslag
- flauwvallen, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd

### Andere bijwerkingen

**Vaak** (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Zere keel
- Huiduitslag
- Gewrichtspijn
- Een reactie op de plaats van de injectie (zoals roodheid, zwelling en pijn)

### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden (zie de onderstaande details). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

[www.fagg.be](http://www.fagg.be)

Afdeling Vigilantie:

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

## 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket en op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
- Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C).
- De voorgevulde pen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
- Tezspire kan in de buitenverpakking maximaal 30 dagen bij kamertemperatuur (20°C - 25°C) worden bewaard. Wanneer Tezspire op kamertemperatuur is gekomen, plaats het dan niet terug in de koelkast. Tezspire dat langer dan 30 dagen bij kamertemperatuur is bewaard, moet veilig worden weggegooid.
- Niet schudden, in de vriezer bewaren of blootstellen aan hitte.
- Gebruik dit geneesmiddel niet als het gevallen of beschadigd is, of als de veiligheidszegel op de doos kapot is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

### Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is tezepelumab.
- De andere stoffen in dit middel zijn azijnzuur (E 260), L-proline, polysorbaat 80 (E 433), natriumhydroxide en water voor injecties.

### Hoe ziet Tezspire eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tezspire is een heldere tot vrijwel doorschijnende, kleurloze tot lichtgele oplossing.

Tezspire is te krijgen in een verpakking met 1 voorgevulde pen om één keer te gebruiken of in een meerstuksverpakking die 3 (3 verpakkingen van 1) voorgevulde pennen bevat.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

AstraZeneca AB  
SE-151 85 Södertälje  
Zweden

### Fabrikant

AstraZeneca AB  
Gärtnavägen  
SE-152 57 Södertälje  
Zweden

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

**België/Belgique/Belgien**

AstraZeneca S.A./N.V.  
Tel: +32 2 370 48 11

**България**

АстраЗенека България ЕООД  
Тел.: +359 24455000

**Česká republika**

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.  
Tel: +420 222 807 111

**Danmark**

AstraZeneca A/S  
Tlf.: +45 43 66 64 62

**Deutschland**

AstraZeneca GmbH  
Tel: +49 40 809034100

**Eesti**

AstraZeneca  
Tel: +372 6549 600

**Ελλάδα**

AstraZeneca A.E.  
Τηλ: +30 210 6871500

**España**

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.  
Tel: +34 91 301 91 00

**France**

AstraZeneca  
Tél: +33 1 41 29 40 00

**Hrvatska**

AstraZeneca d.o.o.  
Tel: +385 1 4628 000

**Ireland**

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC  
Tel: +353 1609 7100

**Ísland**

Vistor  
Sími: +354 535 7000

**Italia**

AstraZeneca S.p.A.  
Tel: +39 02 00704500

**Κύπρος**

Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ  
Τηλ: +357 22490305

**Latvija**

SIA AstraZeneca Latvija  
Tel: +371 67377100

**Lietuva**

UAB AstraZeneca Lietuva  
Tel: +370 5 2660550

**Luxembourg/Luxemburg**

AstraZeneca S.A./N.V.  
Tél/Tel: +32 2 370 48 11

**Magyarország**

AstraZeneca Kft.  
Tel.: +36 1 883 6500

**Malta**

Associated Drug Co. Ltd  
Tel: +356 2277 8000

**Nederland**

AstraZeneca BV  
Tel: +31 85 808 9900

**Norge**

AstraZeneca AS  
Tlf: +47 21 00 64 00

**Österreich**

AstraZeneca Österreich GmbH  
Tel: +43 1 711 31 0

**Polska**

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 245 73 00

**Portugal**

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.  
Tel: +351 21 434 61 00

**România**

AstraZeneca Pharma SRL  
Tel: +40 21 317 60 41

**Slovenija**

AstraZeneca UK Limited  
Tel: +386 1 51 35 600

**Slovenská republika**

AstraZeneca AB, o.z.  
Tel: +421 2 5737 7777

**Suomi/Finland**

AstraZeneca Oy  
Puh/Tel: +358 10 23 010

**Sverige**

AstraZeneca AB  
Tel: +46 8 553 26 000

## Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: <https://www.ema.europa.eu>.

## Gebruiksaanwijzing

### Tezspire 210 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde pen tezepelumab

In deze 'Gebruiksaanwijzing' staat informatie over hoe een injectie met Tezspire toegediend wordt.

Voordat u uw Tezspire voorgevulde pen gebruikt, moet uw zorgverlener aan u of uw verzorger laten zien hoe u deze op de juiste manier gebruikt. **Lees deze 'Gebruiksaanwijzing' voordat u uw Tezspire voorgevulde pen gaat gebruiken en elke keer als u een nieuwe injectie krijgt.** Er kan nieuwe informatie zijn. Deze informatie mag niet in de plaats komen van een gesprek met uw zorgverlener over uw gezondheidstoestand en uw behandeling.

Als u of uw verzorger vragen heeft, neem dan contact op met uw zorgverlener.

## Belangrijke informatie die u moet weten voordat Tezspire wordt geïnjecteerd

**Bewaar Tezspire in de koelkast tussen 2°C en 8°C in de buitenverpakking totdat u klaar bent om het te gebruiken.** Tezspire kan in de buitenverpakking waarin u het geneesmiddel gekregen heeft maximaal 30 dagen bij kamertemperatuur tussen 20°C en 25°C worden bewaard. Wanneer Tezspire op kamertemperatuur is gekomen, plaats het dan **niet** terug in de koelkast. Gooi een Tezspire voorgevulde pen die langer dan 30 dagen op kamertemperatuur is bewaard weg (zie stap 10).

Gebruik uw Tezspire voorgevulde pen **niet** als:

- deze bevroren is geweest
- deze gevallen of beschadigd is
- de veiligheidszegel op de doos kapot is
- de houdbaarheidsdatum (EXP) voorbij is

Schud uw voorgevulde pen **niet**.


Deel de Tezspire voorgevulde pen **niet** met anderen. Gebruik de Tezspire voorgevulde pen **niet** meer dan één keer.

Stel uw Tezspire voorgevulde pen **niet** bloot aan hitte.

Is een van de bovenstaande situaties aan de orde? Gooi de voorgevulde pen dan weg in een prikbestendige naaldencontainer en gebruik een nieuwe Tezspire voorgevulde pen. In elke Tezspire voorgevulde pen zit 1 dosis Tezspire die maar 1 keer kan worden gebruikt.


**Zorg ervoor dat de Tezspire voorgevulde pen en alle andere medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen gehouden worden.**

Tezspire wordt alleen gegeven als een injectie onder de huid (ook wel 'subcutaan' genoemd).



**Vorbereiden op de injectie met Tezspire**  
**Stap 1 – Zet de spullen die nodig zijn klaar**

- 1 Tezspire voorgevulde pen uit de koelkast
- 1 alcoholdoekje
- 1 watje of gaasje
- 1 kleine pleister (als u dat wilt)
- 1 prikbestendige naaldencontainer. Zie stap 10 voor de stappen om uw gebruikte Tezspire voorgevulde pen veilig weg te gooien.



**Stap 2 – Vorbereiding voor het gebruik van uw Tezspire voorgevulde pen**

**Laat Tezspire ongeveer 60 minuten of langer op kamertemperatuur (tussen 20°C en 25°C) komen (niet langer dan 30 dagen) voordat u de injectie geeft.**

Bewaar de voorgevulde pen in de buitenverpakking, ter bescherming tegen licht.

Verwarm de voorgevulde pen **niet** op een andere manier. Warm deze bijvoorbeeld **niet** op in een magnetron of in heet water en plaats de voorgevulde pen **niet** in direct zonlicht, of in de buurt van andere warmtebronnen.



Plaats Tezspire **niet** terug in de koelkast als Tezspire op kamertemperatuur is gekomen. Als Tezspire langer dan 30 dagen bij kamertemperatuur is bewaard, moet het worden weggegooid.

Haal het naaldkapje **niet** weg tot u bij stap 6 van deze gebruiksaanwijzing bent.

### Stap 3 – Pak en controleer de voorgevulde pen


Pak het midden van de voorgevulde pen vast om de voorgevulde pen uit de doos te halen.

**Controleer de voorgevulde pen op beschadigingen.** Gebruik de voorgevulde pen **niet** als deze is beschadigd.

**Controleer de houdbaarheidsdatum** van de voorgevulde pen. Gebruik deze **niet** als de houdbaarheidsdatum voorbij is.

**Bekijk de vloeistof door het kijkvenster.** De vloeistof moet helder en kleurloos tot lichtgeel zijn.

Injecteer Tezspire **niet** als de vloeistof troebel is, verkleurd is of grote deeltjes bevat. U ziet mogelijk kleine luchtbelletjes in de vloeistof. Dit is normaal. U hoeft hier niets aan te doen.



### De injectie met Tezspire geven

#### Stap 4 – Kies de injectieplaats


Als u zichzelf de injectie geeft, is de **geadviseerde injectieplaats** de voorkant van uw dij of het onderste deel van uw buik. Geef uzelf **geen** injectie in uw arm.

Een verzorger kan u in de bovenarm, dij of buik injecteren.

Kies voor elke injectie een andere plaats, die ten minste 3 cm verwijderd is van de plaats waar u voor het laatst heeft geïnjecteerd.


Geef **geen** injectie:

- binnen 5 cm rond uw navel
- waar de huid gevoelig is, blauwe plekken heeft, schilferig is of hard is
- in littekens of beschadigde huid
- door kleding heen




### Stap 5 – Was uw handen en maak de injectieplaats schoon

Was uw handen goed met water en zeep.  
Maak de injectieplaats schoon met een alcoholdoekje in een draaiende beweging. Laat aan de lucht drogen.  
Raak het schoongemaakte gebied **niet** aan vóór het injecteren.  
Blaas of wapper **niet** naar het schoongemaakte gebied.



### Stap 6 – Haal het naaldkapje eraf

Haal het naaldkapje **niet** weg tot u klaar bent om de injectie te geven.  
Houd de voorgevulde pen met 1 hand vast en trek het naaldkapje er met uw andere hand voorzichtig recht af.  
Leg het naaldkapje opzij om later weg te gooien.  
De oranje naaldbeschermer is nu zichtbaar. De oranje naaldbeschermer dient om te voorkomen dat u de naald aanraakt.  
Raak de naald **niet** aan en druk niet met uw vinger op de oranje naaldbeschermer.  
Plaats het naaldkapje **niet** terug op de voorgevulde pen. U kunt de injectie te vroeg laten plaatsvinden of de naald beschadigen.




## Stap 7 – Geef de injectie met Tezspire

Volg de instructies van uw zorgverlener over hoe u moet injecteren. U kunt de huid op de injectieplaats voorzichtig samenknijpen of de injectie toedienen zonder de huid samen te knijpen.


Injecteer Tezspire door de stappen in afbeeldingen a, b, c en d te volgen. Tijdens het injecteren hoort u de eerste klik die aangeeft dat de injectie is gestart. Houd de voorgevulde pen 15 seconden ingedrukt totdat u de tweede klik hoort.

Verander de positie van de voorgevulde pen **niet** nadat de injectie is gestart.




### Plaats de voorgevulde pen.

- Plaats de oranje naaldbeschermer plat tegen uw huid (hoek van 90 graden).
- Zorg ervoor dat u het kijkvenster kunt zien.




**Druk stevig omlaag totdat u de oranje naaldbeschermer niet meer kunt zien.**

- U hoort de eerste 'klik', wat aangeeft dat de injectie is gestart.
- De oranje zuiger beweegt tijdens de injectie naar beneden in het kijkvenster.



**Houd ongeveer 15 seconden stevig ingedrukt.**

- U hoort een tweede 'klik', wat aangeeft dat de injectie klaar is.
- De oranje zuiger vult het kijkvenster.



**Beweeg de voorgevulde pen recht omhoog nadat u klaar bent met uw injectie.**

- De oranje naaldbeschermer schuift naar beneden en vergrendelt op zijn plaats over de naald.

## Stap 8 – Controleer het kijkvenster

Controleer het kijkvenster om er zeker van te zijn dat al het geneesmiddel is geïnjecteerd.


Als de oranje zuigerstang het kijkvenster niet vult, heeft u mogelijk niet de volledige dosis gekregen.

Als dit gebeurt of als u andere zorgen heeft, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Voor de  
injectie




Na de  
injectie



### Stap 9 – Controleer de injectieplaats

Er kan een klein beetje bloed of vocht op de plaats van de injectie zijn. Dit is normaal. Druk voorzichtig met een watje of gaasje op de huid totdat het bloeden stopt. Wrijf **niet** over de injectieplaats. Plak, als dit nodig is, een kleine pleister op de injectieplaats.



### Het weggooien van Tezspire

#### Stap 10 – Gooi de gebruikte voorgevulde pen veilig weg

Elke voorgevulde pen bevat één enkele dosis Tezspire en **kan niet opnieuw worden gebruikt**. Plaats het naaldkapje **niet** terug op de voorgevulde pen. Gooi meteen na gebruik uw gebruikte voorgevulde pen en naaldkapje in een **naaldencontainer**. Gooi de andere gebruikte spullen bij uw huishoudelijk afval. Gooi de voorgevulde pen **niet** bij uw huishoudelijk afval.



### Richtlijnen voor weggooien

Gooi de volle naaldencontainer weg zoals dit is uitgelegd door uw zorgverlener of apotheker.

Gooi uw gebruikte naaldencontainer **niet** bij uw huishoudelijk afval, tenzij dit is toegestaan in uw gebied.

Gebruik uw gebruikte naaldencontainer **niet** opnieuw.